

Intervento ambulatoriale nelle problematiche di dipendenza

Risultati dell'indagine presso gli utenti 2014

Raccolta di tabelle statistiche

Mariana Astudillo, Luca Notari, Etienne Maffli

Ringraziamenti

Ringraziamo vivamente sia i collaboratori e le collaboratrici che i pazienti delle istituzioni che hanno partecipato e che hanno gentilmente accettato di riempire i questionari del monitoraggio act-info. Ringraziamo ugualmente i collaboratori e le collaboratrici dei servizi di consultazione che hanno effettuato i lavori di logistica e di registrazione dei dati. I nostri migliori ringraziamenti vanno anche all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) che finanzia l'insieme della rete act-info. Grazie anche a Edith Bacher e Christiane Gmel per la grafica e l'impaginazione di questo rapporto come pure a Marina Delgrande Jordan per la sua preziosa collaborazione nell'elaborazione delle procedure d'analisi.

Complementi d'informazione: Etienne Maffli, tel. 021 321 29 54, fax 021 321 29 40,
e-mail emaffli@addictionsuisse.ch

Realizzazione: Mariana Astudillo Luca Notari & Etienne Maffli
Dipendenze Svizzera

Diffusione: Ricerca, Dipendenze Svizzera, casella postale 870, 1001
Losanna,
tel. 021 321 29 46, fax 021 321 29 40,
e-mail ebacher@addictionsuisse.ch

Prezzo: Fr. 10.–

Lingua del testo originale : tedesco

Grafica/impaginazione: Dipendenze Svizzera

Copyright: © Dipendenze Svizzera, Losanna 2016

Citazione raccomandata: Astudillo, M., Notari & L., Maffli, E. (2016). Intervento ambulatoriale nelle problematiche di dipendenza. Risultati dell'indagine presso gli utenti 2014 – Raccolta di tabelle statistiche. Losanna: Dipendenze Svizzera.

Indice

<i>act-info</i> –addiction care and therapy information.....	7
<i>act-info</i> nel settore ambulatoriale dell'aiuto psicosociale nel campo delle dipendenze.....	7

ENTRATA

T1	Sesso e età dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2014)
T2	Stato civile e nazionalità dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2014)
T3	Grado di urbanizzazione del domicilio, tipo di nucleo familiare e situazione di domicilio dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2014)
T4	Tipo di relazione di coppia, numero di figli, di figli che vivono nel nucleo familiare dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2014)
T5	Più alta formazione portata a termine e statuto professionale dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2014)
T6	Fonte di reddito principale e attività dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2014)
T7	Reddito mensile netto e debiti dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2014)
T8	Incarcerazione o detenzione preventiva prima dell'entrata, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2014)
T9	Istanza d'invio principale, secondo il problema principale e per i parenti o conoscenti (2014)
T10	Intervento in seguito ad una misura giudiziaria e tipo di misura, secondo il problema principale (solo pazienti) (2014)
T11	Trattamenti/accompagnamenti anteriori l'ammissione e tipi di intervento, secondo il problema principale e per parenti o conoscenti (2014)
T12	Trattamento sostitutivo o prescrizione di eroina al momento dell'ammissione, secondo il problema principale (solo pazienti)
T13	Problema principale all'entrata (solamente pazienti) (2014)
T14	Uso di sostanze multiple e combinazioni di sostanze (2014)

- T15.1a Frequenza di consumo della principale sostanza problematica nel corso degli ultimi 30 giorni prima dell'entrata (2014), uomini
- T15.1b Frequenza di consumo della principale sostanza problematica nel corso degli ultimi 30 giorni prima dell'entrata (2014), donne
- T15.1c Frequenza di consumo della principale sostanza problematica nel corso degli ultimi 30 giorni prima dell'entrata (2014), uomini e donne
- T15.2a Frequenza di manifestazione del problema principale nel corso degli ultimi 30 giorni prima dell'entrata (2014), uomini
- T15.2b Frequenza di manifestazione del problema principale nel corso degli ultimi 30 giorni prima dell'entrata (2014), donne
- T15.2c Frequenza di manifestazione del problema principale nel corso degli ultimi 30 giorni prima dell'entrata (2014), uomini e donne
- T16.1a Età all'epoca del primo consumo, all'inizio del consumo regolare, del consumo problematico e periodo di latenza (2014), uomini
- T16.1b Età all'epoca del primo consumo, all'inizio del consumo regolare, del consumo problematico e periodo di latenza (2014), donne
- T16.1c Età all'epoca del primo consumo, all'inizio del consumo regolare, del consumo problematico e periodo di latenza (2014), uomini e donne
- T16.2a Età all'epoca della prima manifestazione del problema principale, della manifestazione regolare, della manifestazione problematica e periodo di latenza (2014), uomini
- T16.2b Età all'epoca della prima manifestazione del problema principale, della manifestazione regolare, della manifestazione problematica e periodo di latenza (2014), donne
- T16.2c Età all'epoca della prima manifestazione del problema principale, della manifestazione regolare, della manifestazione problematica e periodo di latenza (2014), uomini e donne
- T17 Modo di amministrazione della principale sostanza problematica prima dell'entrata (2014)
- T18.1 Prevalenza a vita delle iniezioni, nel corso degli ultimi 30 giorni e degli ultimi 12 mesi prima dell'entrata, scambio di materiale d'iniezione, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2014)
- T18.2 Età all'epoca della prima iniezione, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2014)
- T19.1a Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto alla principale sostanza problematica (2014), uomini
- T19.1b Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto alla principale sostanza problematica (2014), donne
- T19.1c Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto alla principale sostanza problematica (2014), uomini e donne

- T19.2a Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto al problema principale (non inerente a una sostanza) (2014), uomini
- T19.2b Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto al problema principale (non inerente a una sostanza) (2014), donne
- T19.2c Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto al problema principale (non inerente a una sostanza) (2014), uomini e donne
- T20.1a Frequenza del consumo delle sostanze secondarie secondo il problema principale (solo pazienti) (2014)
- T20.1b Frequenza del consumo delle sostanze secondarie secondo il problema principale (solo pazienti) (2014)
- T21 Frequenza del consumo di alcol, numero di "bicchieri standard" al giorno e frequenza di forti consumi di alcol prima dell'entrata, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2014)
- T22 Frequenza del consumo di tabacco e numero di sigarette al giorno nel corso dei 30 ultimi giorni prima dell'entrata, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2014)
- T23a Obiettivo di consumo all'entrata quanto alla principale sostanza problematica (2014), uomini
- T23b Obiettivo di consumo all'entrata quanto alla principale sostanza problematica (2014), donne
- T23c Obiettivo di consumo all'entrata quanto alla principale sostanza problematica (2014), uomini e donne
- T24a Problemi psichici nel corso della vita (2014), uomini
- T24b Problemi psichici nel corso della vita (2014), donne
- T24c Problemi psichici nel corso della vita (2014), uomini e donne
- T25 Parenti/conoscenti: legame tra l'utente e la persona sintomatica (2014)
- T26 Parenti/conoscenti: problema principale della persona sintomatica (2014)

USCITA

- T27 Sesso e età dei pazienti all'uscita (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2014)
- T28 Stato civile e grado di urbanizzazione del domicilio dei pazienti all'uscita (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2014)
- T29 Tipo di nucleo familiare, situazione di domicilio e tipo di relazione di coppia dei pazienti all'uscita (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2014)
- T30 Fonte di reddito principale e attività principale all'uscita, secondo il problema principale e per i parenti o conoscenti (2014) e dei parenti o conoscenti (2014)
- T31 Statuto professionale dei pazienti all'uscita (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2014)

T32a	Ragione principale della fine del trattamento/accompagnamento dei pazienti (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2014)
T32b	Destinazione dei trasferimenti dei pazienti (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2014)
T32c	Causa di decesso dei pazienti (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2014)
T33	Durata dell'intervento sui pazienti (in rapporto al problema principale) e sui parenti o conoscenti (2014)
T34	Trattamento sostitutivo durante e immediatamente dopo l'intervento, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2014)
T35	Postassistenza prevista e preparata, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2014)
T36	Problemi di dipendenza all'uscita, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2014)
T37	Frequenza delle ricadute e sostanza o comportamento implicato nel corso dell'intervento, in rapporto al problema principale ¹ (solamente pazienti) (2014)
T38	Frequenza del consumo di tabacco e numero di sigarette al giorno nel corso dei 30 giorni precedenti l'uscita, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2014)
T39	Obiettivo di consumo all'uscita e pronostico, in rapporto alla principale sostanza problematica (solamente pazienti) (2014)

Allegati

Dati di base delle istituzioni che non partecipano al monitoraggio *act-info*

A1	Sesso e età all'entrata, in funzione del problema principale (2014)
A2	Problema principale all'entrata (2014)

act-info - addiction care and therapy information

La Rete di monitoraggio degli interventi e dei trattamenti delle dipendenze in Svizzera (*act-info*) raccoglie nel suo seno i cinque sistemi statistici che erano realizzati in materia di intervento e di trattamento della dipendenza in Svizzera. Tali sistemi sono:

- SAMBAD (Statistica del settore ambulatoriale dell'aiuto psicosociale in materia di dipendenza)
- Residalc (Statistica dei trattamenti residenziali della dipendenza all'alcol in Svizzera)
- FOS (Statistica della Lega per la valutazione dei trattamenti residenziali della tossicomania)
- HeGeBe (Statistica dei trattamenti con prescrizione di eroina)
- Metadone (Statistica nazionale dei trattamenti con prescrizione di metadone)

Dal 2004 queste cinque statistiche dispongono di strumenti armonizzati e ottimizzati. I dati comuni sono integrati in una banca dati centralizzata che permette di procedere ad analisi concernenti l'insieme dei settori. L'adozione degli standard europei (Treatment Demande Indicator) permette di garantire anche la comparabilità dei dati al livello internazionale.

act-info è finanziato dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e l'analisi e la raccolta dei dati nei differenti campi di trattamento sono affidate a Dipendenze Info Svizzera di Losanna e all'Istituto di ricerca sulla salute pubblica e sulle dipendenze affiliato all'Università di Zurigo (ISGF).

act-info nel settore ambulatoriale dell'aiuto psicosociale in materia di dipendenza (SAMBAD)

Gli strumenti di monitoraggio *act-info* sono stati introdotti a partire dal 2004 nel settore ambulatoriale dell'aiuto psicosociale in materia di dipendenza e hanno rimpiazzato i vecchi questionari in vigore dal 1994. Dopo diversi anni di utilizzo, una revisione di questi strumenti ha avuto luogo e i nuovi questionari sono stati introdotti il 1° gennaio 2013. Questo processo è stato armonizzato con la revisione delle norme europee. Per poter rispondere ai differenti bisogni, per il settore ambulatoriale è stata introdotta pure una versione ridotta. La realizzazione di *act-info* in questo settore è affidata a Dipendenze Info Svizzera.

La statistica *act-info* SAMBAD da una visione dell'utenza dell'aiuto ambulatoriale in materia di dipendenza in Svizzera. I dati sono raccolti all'inizio e alla fine dell'intervento. Le informazioni rilevate al momento dell'entrata permettono di valutare in particolare le caratteristiche socio-demografiche degli utenti, l'eventuale presenza di trattamenti precedenti, le modalità di consumo e la presenza di problemi psicosociali precedenti l'intervento. Le informazioni finali rilevate al termine dell'intervento evidenziano in particolare le circostanze dell'uscita e le caratteristiche socio-demografiche dell'utenza in quel preciso momento.

Nel 2014, 71 tra le 194 istituzioni registrate nel settore ambulatoriale dell'aiuto psicosociale in materia di dipendenza hanno partecipato al monitoraggio *act-info*. Queste istituzioni sono sia servizi deputati alla consultazione specialistica dei problemi inerenti all'alcol e/o alle droghe illegali, sia servizi polivalenti offrenti ugualmente un aiuto per i problemi di dipendenza.

Qualche spiegazione riguardo alle tabelle

La presente statistica descrittiva dei dati dell'indagine act-info presso gli utenti del settore ambulatoriale dell'aiuto psicosociale in materia di dipendenza si basa su due tipi di tabelle:

- quando la domanda contiene delle categorie di risposte predefinite o ricodificate in parti distinte (per esempio « stato civile » o « età »), la tabella indica le percentuali delle differenti categorie di risposte
- quando la domanda non contiene delle categorie predefinite, ma richiede un valore numerico (per esempio « età all'inizio del consumo problematico »), la tabella presenta dei parametri di posizione (media, mediana) e dei parametri di dispersione (deviazione standard, 1° quartile, 3° quartile)

La maggior parte delle tabelle presenta i risultati in maniera distinta per i sottogruppi di pazienti che hanno menzionato l'**alcol**, un **oppiaceo** (eroina in particolare), la **cocaina** (e derivati) o la **canapa** come problema principale al momento dell'entrata. I **parenti o conoscenti** che consultano per i problemi di un terzo sono ugualmente oggetto di analisi separate per gli aspetti socio-demografici. Invece, gli utenti (poco numerosi) che hanno menzionato altre sostanze come problema principale (per esempio un stimolante o le sostanze volatili) o un problema di dipendenza non inerente a una sostanza (per esempio gioco patologico), non sono differenziati nei risultati (eccetto nei temi direttamente inerenti ai modi di consumo o alle forme di comportamenti additivi non inerenti alle sostanze). Queste persone sono tuttavia incluse nelle analisi relative all'insieme degli interventi che figurano nei blocchi a destra delle tabelle rispettive. Tutte le analisi sono effettuate separatamente per gli uomini, per le donne e per i sessi riuniti (nel caso in cui ci fossero persone il cui sesso non è conosciuto, queste saranno comprese nella colonna « Totale »).

Solo le risposte valide sono considerate nelle analisi. Cioè, le risposte « non noto » e le informazioni mancanti (missings) sono escluse dalle analisi. Il numero di risposte valide **N** rappresenta il numero esatto di casi sui quali sono calcolati le percentuali o altri parametri; esso viene indicato per ogni gruppo o sottogruppo. In basso alla tabella viene anche indicato il numero corrispondente di dati mancanti. La presenza di numerosi dati mancanti costringe a interpretare i risultati con particolare prudenza.

Le note in basso alla tabella danno informazioni sulle eventuali particolarità dei gruppi di riferimento e sul tipo di domanda. Quando sono possibili più risposte a una stessa domanda (per esempio nelle tabelle del tema T19, « altri problemi di dipendenza ») le percentuali ottenute non si possono addizionare.

Le istituzioni che non partecipano al monitoraggio act-info sono state invitate a fornire i dati di base (età, sesso e problema principale all'entrata). Quindici istituzioni hanno risposto a questa richiesta. I dati di queste 15 istituzioni sono stati analizzati separatamente e i risultati sono presenti in allegato.

ALLEGATI

T1 Sesso e età dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2014)

	Pazienti: problema principale												Parenti o conoscenti			Tutti gli interventi			
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Sesso*																			
uomini	68.5			71.2			83.2			83.5			21.7			63.5			3 809
donne	31.5			28.8			16.8			16.5			78.3			36.5			2 190
sesto non noto	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0
N**	2 014	927	2 941	222	90	312	168	34	202	827	163	990	203	733	936	3 809	2 190	5 999	5 999
Età (in anni)*																			
fino a 14	0.0	0.3	0.1	0.0	1.1	0.3	0.0	0.0	0.0	4.8	6.1	5.1	3.5	0.8	1.4	1.7	1.3	1.5	92
15-19	2.2	2.1	2.1	1.4	4.5	2.3	4.8	11.8	6.0	58.1	55.2	57.6	3.0	2.2	2.4	16.0	8.0	13.1	781
20-24	4.0	2.6	3.6	8.1	12.4	9.3	13.2	5.9	11.9	12.4	11.0	12.1	4.0	4.4	4.3	7.2	5.4	6.6	392
25-29	7.9	6.0	7.3	10.4	14.6	11.6	19.8	14.7	18.9	9.1	11.0	9.4	5.0	7.2	6.7	9.0	7.6	8.5	508
30-34	10.9	9.2	10.4	17.6	20.2	18.3	23.4	20.6	22.9	6.5	8.0	6.8	4.5	11.3	9.9	10.9	10.2	10.7	637
35-39	10.2	11.2	10.5	21.6	14.6	19.6	17.4	17.6	17.4	4.1	1.2	3.6	7.0	9.0	8.6	9.7	9.7	9.7	580
40-44	13.4	12.0	13.0	17.6	10.1	15.4	12.6	14.7	12.9	2.3	3.1	2.4	7.0	14.9	13.2	10.2	12.1	10.9	649
45-49	14.0	16.8	14.9	14.9	15.7	15.1	6.6	14.7	8.0	1.8	2.5	1.9	15.6	17.7	17.2	10.6	14.9	12.2	726
50-54	14.9	13.9	14.6	5.4	5.6	5.5	1.2	0.0	1.0	0.4	1.2	0.5	17.1	14.0	14.6	9.8	11.9	10.5	629
55-59	9.3	10.3	9.6	2.3	1.1	1.9	0.6	0.0	0.5	0.5	0.0	0.4	9.5	7.7	8.1	6.1	7.8	6.7	402
60-64	7.1	8.0	7.4	0.9	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.1	8.5	3.5	4.6	4.5	5.2	4.8	284
65-69	3.6	3.7	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	3.9	4.1	2.2	3.2	2.6	154
70-74	1.5	2.8	1.9	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	4.5	2.2	2.7	1.2	2.0	1.5	88
75 e più	1.0	1.1	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	1.2	2.2	0.8	0.9	0.9	51
N**	2 010	922	2 932	222	89	311	167	34	201	825	163	988	199	724	923	3 798	2 175	5 973	5 973
<i>dati mancanti</i>	4	5	9	0	1	1	1	0	1	2	0	2	4	9	13	11	15	26	26
Età																			
media	45.1	46.5	45.5	38.0	35.3	37.3	33.4	34.1	33.5	21.9	22.2	21.9	48.6	44.4	45.3	38.1	42.2	39.6	
deviazione standard	13.0	13.0	13.0	9.0	10.0	9.4	8.8	9.4	8.9	8.3	9.3	8.4	16.5	13.1	14.0	15.4	14.7	15.3	
1° quartile	35.0	37.0	35.7	32.3	28.7	30.5	27.1	27.8	27.2	16.7	16.3	16.6	39.3	34.7	35.3	25.1	31.6	27.6	
mediana	45.6	47.1	46.3	38.2	34.3	37.2	33.4	34.3	33.5	17.9	18.0	17.9	50.0	45.0	46.0	37.7	43.3	40.0	
3° quartile	54.0	55.3	54.3	44.8	43.0	44.5	38.64	40.2	39.5	24.8	25.8	25.1	58.8	52.7	54.0	49.9	52.3	50.8	
N**	2 010	922	2 932	222	89	311	167	34	201	825	163	988	199	724	923	3 798	2 175	5 973	
<i>dati mancanti</i>	4	5	9	0	1	1	1	0	1	2	0	2	4	9	13	11	15	26	

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T2 Stato civile e nazionalità dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2014)

	Pazienti: problema principale												Parenti o conoscenti			Tutti gli interventi			N
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Stato civile*																			
celibe/nubile	42.1	33.1	39.3	68.1	69.0	68.4	60.0	62.5	60.4	92.5	90.5	92.2	22.2	25.6	24.9	56.2	39.4	50.0	2 763
sposato-a	33.9	28.8	32.3	17.6	9.5	15.3	23.2	12.5	21.4	4.6	2.7	4.3	63.1	50.8	53.4	26.9	32.5	28.9	1 598
separato-a	5.3	4.9	5.2	2.0	6.0	3.1	5.2	0.0	4.3	1.1	0.0	0.9	1.7	2.1	2.0	3.8	3.4	3.7	203
divorziato-a	16.6	26.6	19.8	11.8	14.3	12.5	9.7	25.0	12.3	1.6	6.1	2.4	10.2	17.8	16.2	11.6	20.0	14.7	810
vedovo-a	1.1	5.3	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	2.7	2.4	0.7	3.5	1.7	94
unione registrata	0.9	1.3	1.0	0.5	1.2	0.7	1.9	0.0	1.6	0.3	0.7	0.3	1.7	1.0	1.2	0.8	1.2	1.0	53
N**	1 877	871	2 748	204	84	288	155	32	187	745	148	893	176	669	845	3 495	2 026	5 521	5 521
<i>dati mancanti</i>	137	56	193	18	6	24	13	2	15	82	15	97	27	64	91	314	164	478	478
Nazionalità*																			
CH	78.3	82.9	79.8	65.8	75.0	68.6	66.4	74.2	67.8	83.2	81.1	82.8	84.7	86.1	85.8	78.4	84.4	80.6	4 388
EU	16.6	12.2	15.2	25.1	19.0	23.3	21.5	19.4	21.1	9.6	15.5	10.6	13.1	9.5	10.2	15.4	11.1	13.8	753
altra	5.1	4.9	5.0	9.0	6.0	8.1	12.1	6.5	11.1	7.2	3.4	6.6	2.3	4.4	4.0	6.2	4.5	5.6	303
N**	1 824	855	2 679	199	84	283	149	31	180	748	148	896	176	656	832	3 445	1 999	5 444	5 444
<i>dati mancanti</i>	190	72	262	23	6	29	19	3	22	79	15	94	27	77	104	364	191	555	555

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T3 Grado di urbanizzazione del domicilio, tipo di nucleo familiare e situazione di domicilio dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2014)

	Pazienti: problema principale												Parenti o conoscenti			Tutti gli interventi			N	
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale		
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale								%
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Grado di urbanizzazione*																				
grandi centri urbani	9.5	10.6	9.9	1.4	0.0	1.0	0.6	2.9	1.0	0.0	0.6	0.1	10.2	9.2	9.4	5.7	7.8	6.5	375	
periferia dei grandi centri	11.5	11.2	11.4	5.1	3.4	4.6	7.4	11.8	8.2	5.9	4.9	5.8	15.6	11.7	12.5	9.3	9.6	9.4	548	
città di media importanza	15.2	16.1	15.5	15.3	13.5	14.8	21.6	29.4	23.0	27.7	27.2	27.6	16.1	19.9	19.1	19.0	19.2	19.0	1 104	
piccole città	34.9	35.3	35.0	45.6	53.9	48.0	47.5	41.2	46.4	35.5	34.0	35.2	28.5	34.5	33.2	36.4	36.6	36.5	2 118	
campagne	29.0	26.8	28.3	32.6	29.2	31.6	22.8	14.7	21.4	30.9	33.3	31.3	29.6	24.7	25.7	29.6	26.8	28.5	1 656	
N**	1 954	895	2 849	215	89	304	162	34	196	809	162	971	186	684	870	3 697	2 104	5 801	5 801	
<i>dati mancanti</i>	60	32	92	7	1	8	6	0	6	18	1	19	17	49	66	112	86	198	198	
Tipo di nucleo familiare (30 ultimi giorni)*																				
da solo-a	37.2	32.9	35.8	37.8	28.4	35.2	25.7	37.5	27.7	13.6	16.3	14.1	14.8	12.4	12.9	29.6	26.3	28.5	1 366	
con famiglia d'origine (genitori, ecc.)	7.3	4.1	6.3	14.5	13.5	14.2	17.8	21.9	18.5	64.9	46.8	61.9	4.5	6.1	5.7	23.2	11.6	19.4	930	
con partner e/o figli	45.2	53.8	47.9	25.4	41.9	30.0	42.8	34.4	41.3	8.9	18.4	10.5	79.5	81.5	81.1	35.5	53.6	41.4	1 988	
con amici o altre persone	3.8	1.8	3.1	6.7	4.1	6.0	5.9	0.0	4.9	3.5	3.5	3.5	0.0	0.0	0.0	4.0	1.8	3.3	158	
in prigione	0.4	0.0	0.3	0.5	0.0	0.4	1.3	0.0	1.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	13	
istituzione terapeutica/foyer	1.7	1.2	1.5	4.1	8.1	5.2	1.3	0.0	1.1	2.8	3.5	2.9	0.0	0.0	0.0	2.0	1.4	1.8	85	
ospedale/clinica	1.8	2.5	2.0	2.1	1.4	1.9	1.3	3.1	1.6	0.3	0.7	0.3	0.0	0.0	0.0	1.3	1.6	1.4	68	
altro	2.7	3.7	3.0	8.8	2.7	7.1	3.9	3.1	3.8	6.0	10.6	6.7	1.1	0.0	0.2	4.0	3.7	3.9	189	
N**	1 733	812	2 545	193	74	267	152	32	184	720	141	861	88	314	402	3 210	1 587	4 797	4 797	
<i>dati mancanti</i>	281	115	396	29	16	45	16	2	18	107	22	129	115	419	534	599	603	1 202	1 202	
Situazione di domicilio (30 ultimi giorni)*																				
situazione abitativa stabile	91.2	92.3	91.6	79.0	79.2	79.1	93.5	90.0	92.9	89.9	90.2	90.0	97.9	95.3	95.9	90.6	92.4	91.2	4 356	
situazione abitativa instabile/ser	4.0	3.4	3.8	9.7	13.9	10.9	2.9	6.7	3.6	5.6	3.8	5.3	2.1	4.7	4.1	4.6	4.1	4.4	211	
in prigione	0.5	0.0	0.3	2.2	0.0	1.6	1.4	0.0	1.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.4	17	
istituzione/foyer/ospedale/altro	4.4	4.3	4.4	9.1	6.9	8.5	2.2	3.3	2.4	4.4	6.0	4.7	0.0	0.0	0.0	4.2	3.5	4.0	190	
N**	1 744	829	2 573	186	72	258	139	30	169	684	133	817	96	339	435	3 155	1 619	4 774	4 774	
<i>dati mancanti</i>	270	98	368	36	18	54	29	4	33	143	30	173	107	394	501	654	571	1 225	1 225	

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T4 Tipo di relazione di coppia, numero di figli, di figli che vivono nel nucleo familiare dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2014)

	Pazienti: problema principale												Parenti o conoscenti			Tutti gli interventi			
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
Tipo di relazione di coppia*																			
senza partner, sola-a	33.3	37.6	34.8	37.7	30.4	35.7	34.3	15.4	31.3	69.0	49.4	65.4	14.0	15.0	14.8	41.6	34.3	38.9	1 029
relazione-i saltuaria-e	4.5	4.1	4.3	8.2	8.7	8.3	10.0	7.7	9.6	6.3	11.1	7.2	0.0	2.8	2.3	4.9	4.6	4.8	127
relazione fissa, vivendo separato-a	14.8	12.4	14.0	18.0	21.7	19.0	12.9	38.5	16.9	14.3	27.2	16.6	9.3	16.0	14.8	14.6	15.1	14.7	390
relazione fissa, vivendo insieme	47.5	45.9	46.9	36.1	39.1	36.9	42.9	38.5	42.2	10.4	12.3	10.8	76.7	66.2	68.0	38.9	46.1	41.6	1 099
N**	988	510	1 498	61	23	84	70	13	83	364	81	445	43	213	256	1 682	963	2 645	2 645
<i>dati mancanti</i>	1 026	417	1 443	161	67	228	98	21	119	463	82	545	160	520	680	2 127	1 227	3 354	3 354
Numero di figli*																			
nessuno	55.0	49.4	53.3	78.4	75.9	77.7	61.8	71.4	63.6	95.5	90.7	94.7	31.1	29.2	29.6	67.9	52.6	62.9	2 751
1 figlio	14.8	17.2	15.6	14.4	13.8	14.2	21.1	14.3	19.9	2.8	5.7	3.3	21.1	20.5	20.6	11.6	16.0	13.1	571
2 figli	21.1	22.8	21.6	5.2	10.3	6.6	12.2	3.6	10.6	1.3	2.1	1.4	34.4	34.3	34.4	14.2	21.2	16.5	722
3 figli o più	9.1	10.6	9.5	2.0	0.0	1.4	4.9	10.7	6.0	0.4	1.4	0.6	13.3	16.0	15.4	6.3	10.2	7.6	331
N**	1 565	698	2 263	153	58	211	123	28	151	716	140	856	90	332	422	2 939	1 436	4 375	4 375
<i>dati mancanti</i>	449	229	678	69	32	101	45	6	51	111	23	134	113	401	514	870	754	1 624	1 624
Numero dei figli che vivono nel nucleo familiare*																			
nessuno	81.4	75.1	79.4	91.0	93.8	91.8	79.2	89.7	81.2	87.1	87.2	87.2	50.0	47.0	47.7	82.4	72.0	79.0	3 565
1 figlio	7.7	13.6	9.6	4.2	1.5	3.4	12.0	0.0	9.7	5.1	6.4	5.3	27.8	24.3	25.1	7.7	14.0	9.8	440
2 figli	7.9	8.1	8.0	4.2	4.6	4.3	8.0	6.9	7.8	5.2	3.5	4.9	16.7	19.9	19.2	7.0	9.8	7.9	356
3 figli o più	3.0	3.2	3.1	0.6	0.0	0.4	0.8	3.4	1.3	2.6	2.8	2.6	5.6	8.7	8.0	2.9	4.2	3.3	150
N**	1 626	726	2 352	167	65	232	125	29	154	731	141	872	90	321	411	3 042	1 469	4 511	4 511
<i>dati mancanti</i>	388	201	589	55	25	80	43	5	48	96	22	118	113	412	525	767	721	1 488	1 488

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T5 Più alta formazione portata a termine e statuto professionale dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2014)

	Pazienti: problema principale												Parenti o conoscenti			Tutti gli interventi			N
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Più alta formazione portata a termine*																			
nessuna formazione terminata	3.4	3.8	3.5	5.3	10.7	6.8	1.6	13.3	3.9	17.9	19.7	18.2	3.4	1.6	2.0	7.4	5.7	6.8	289
scuola dell'obbligo	10.1	14.1	11.4	22.5	32.1	25.1	21.6	23.3	21.9	51.2	50.8	51.2	8.5	8.5	8.5	21.9	17.1	20.2	856
formazione prof. preliminar	2.6	4.3	3.1	4.6	5.4	4.8	0.8	10.0	2.6	3.2	3.3	3.2	0.9	1.6	1.5	2.6	3.4	2.9	122
formazione generale senza maturità	9.9	5.3	8.4	13.9	14.3	14.0	12.0	3.3	10.3	4.0	2.5	3.7	14.5	8.2	9.6	8.8	6.3	8.0	337
formazione prof. di base/apprendisti	51.6	49.4	50.9	43.7	30.4	40.1	52.0	36.7	49.0	21.1	19.7	20.9	39.3	47.1	45.4	42.8	43.7	43.1	1 824
maturità/scuola magistrale	4.5	4.4	4.5	4.0	3.6	3.9	1.6	3.3	1.9	0.9	0.8	0.9	3.4	5.9	5.4	3.3	4.9	3.8	162
formazione prof. superiore	9.2	7.9	8.8	2.6	1.8	2.4	4.8	0.0	3.9	0.9	0.8	0.9	6.8	8.5	8.1	6.3	6.9	6.5	275
scuola universitaria o università	7.2	9.9	8.1	2.0	1.8	1.9	3.2	6.7	3.9	0.6	2.5	0.9	19.7	16.7	17.3	5.6	10.8	7.4	314
dottorato o abilitazione	1.5	0.9	1.3	1.3	0.0	1.0	2.4	3.3	2.6	0.2	0.0	0.1	3.4	1.9	2.2	1.3	1.1	1.2	51
N**	1 451	658	2 109	151	56	207	125	30	155	658	122	780	117	425	542	2 760	1 470	4 230	4 230
<i>dati mancanti</i>	563	269	832	71	34	105	43	4	47	169	41	210	86	308	394	1 049	720	1 769	1 769
Statuto professionale*																			
senza attività professionale	20.1	30.1	23.1	33.3	40.4	35.4	23.1	23.8	23.2	14.1	19.4	14.9	42.9	15.2	20.0	20.0	28.1	22.3	568
apprendista, praticante	2.6	1.5	2.3	0.8	9.6	3.3	4.4	4.8	4.5	32.7	29.0	32.1	0.0	0.0	0.0	9.1	5.3	8.0	205
manovale, operaio-a ausiliare	4.3	4.1	4.2	13.2	0.0	9.4	4.4	4.8	4.5	3.1	0.0	2.6	0.0	3.0	2.5	4.7	3.3	4.3	110
operaio-a con formaz. pratica	8.4	4.7	7.3	8.5	5.8	7.7	7.7	9.5	8.0	5.1	3.2	4.8	0.0	0.0	0.0	7.4	4.5	6.5	167
oper. con formaz. certif. (AFC)	14.9	4.7	11.8	20.9	7.7	17.1	20.9	19.0	20.5	11.5	4.8	10.6	14.3	0.0	2.5	14.9	5.4	12.2	312
caposquadra	2.2	0.0	1.5	0.8	0.0	0.6	1.1	0.0	0.9	1.4	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	1.8	0.1	1.3	34
impiegato-a non qualificato-a	19.5	31.2	23.0	9.3	21.2	12.7	14.3	19.0	15.2	4.5	12.9	5.8	28.6	36.4	35.0	15.0	27.1	18.4	470
impieg. qualif., quadro medio	12.5	12.2	12.4	5.4	7.7	6.1	12.1	9.5	11.6	4.8	1.6	4.3	14.3	27.3	25.0	9.7	11.5	10.2	260
imp. funz. dirett., quadr. sup.	5.1	2.6	4.3	2.3	0.0	1.7	1.1	0.0	0.9	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	3.8	1.8	3.2	82
indipendente	9.2	7.7	8.8	4.7	3.8	4.4	8.8	0.0	7.1	0.8	0.0	0.7	0.0	18.2	15.0	7.0	7.1	7.0	179
scolaro-a, studente	0.6	0.4	0.6	0.0	3.8	1.1	1.1	9.5	2.7	21.1	29.0	22.3	0.0	0.0	0.0	5.9	4.6	5.6	142
altro statuto	0.6	0.9	0.7	0.8	0.0	0.6	1.1	0.0	0.9	0.6	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.8	1.1	0.9	23
N**	1 082	468	1 550	129	52	181	91	21	112	355	62	417	7	33	40	1 833	719	2 552	2 552
<i>dati mancanti</i>	932	459	1 391	93	38	131	77	13	90	472	101	573	196	700	896	1 976	1 471	3 447	3 447

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T6 Fonte di reddito principale e attività dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2014)

	Pazienti: problema principale												Parenti o conoscenti			Tutti gli interventi			N
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Fonte di reddito principale (nel corso dei 30 ultimi giorni)*																			
stipendio/salario	55.8	41.5	51.2	30.2	17.9	26.8	59.3	32.4	54.3	31.4	24.7	30.3	63.0	66.7	65.8	48.8	43.5	47.0	2 360
risparmi	1.7	0.9	1.5	0.5	0.0	0.4	1.3	0.0	1.1	0.5	0.0	0.4	2.2	0.6	1.0	1.4	0.8	1.2	61
rendita (AVS/AI o altre)	15.7	21.4	17.5	14.9	17.9	15.7	5.3	23.5	8.7	3.7	5.2	3.9	18.5	12.3	13.7	11.9	18.0	13.9	697
assistenza sociale	14.5	15.0	14.7	36.1	41.0	37.5	16.7	20.6	17.4	10.7	16.2	11.7	3.3	1.9	2.2	14.4	13.0	13.9	698
assicurazione disoccupazione	5.8	4.7	5.5	7.4	9.0	7.9	8.0	8.8	8.2	3.4	3.2	3.4	3.3	2.6	2.7	5.3	4.1	4.9	245
sostegno del/della partner	1.7	12.4	5.1	3.0	5.1	3.6	1.3	5.9	2.2	1.2	2.6	1.4	3.3	12.9	10.7	1.7	10.4	4.5	228
sostegno dei genitori/conoscenti	2.9	2.6	2.8	4.5	6.4	5.0	4.0	5.9	4.3	48.2	46.1	47.8	6.5	2.9	3.7	14.8	9.0	12.9	647
spacciando, trafficando	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	5
altre entrate illegali	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.4	0.7	0.0	0.5	0.0	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	3
prostituzione	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	1
assicurazione d'indennità giornaliere	0.8	0.4	0.6	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	1.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.5	0.2	0.4	21
altra	1.2	1.2	1.2	1.5	2.6	1.8	2.0	0.0	1.6	0.7	0.6	0.7	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	51
N**	1 818	849	2 667	202	78	280	150	34	184	764	154	918	92	309	401	3 368	1 649	5 017	5 017
<i>dati mancanti</i>	196	78	274	20	12	32	18	0	18	63	9	72	111	424	535	441	541	982	982
Attività principale (nel corso dei 30 ultimi giorni)*																			
att. a tempo pieno (70% o più)	53.3	30.8	46.4	28.2	14.7	24.3	54.4	31.3	50.3	19.4	15.3	18.7	64.7	48.6	52.4	43.3	30.9	39.4	1 870
attività a tempo parziale	4.2	19.4	8.8	3.2	8.0	4.6	3.4	6.3	3.9	2.3	3.3	2.5	4.7	28.3	22.7	3.6	18.8	8.4	399
lavori occasionali	1.2	1.5	1.3	5.9	4.0	5.3	3.4	3.1	3.4	0.8	0.0	0.6	1.2	0.7	0.8	1.4	1.3	1.4	66
in formazione	2.8	2.3	2.6	2.7	9.3	4.6	4.1	12.5	5.6	56.9	58.7	57.2	2.4	5.4	4.7	17.7	12.1	15.9	757
disoccup., ricerc. di un lavoro	12.9	9.9	12.0	20.7	16.0	19.4	15.6	6.3	14.0	8.4	9.3	8.5	2.4	1.4	1.7	11.7	7.7	10.4	496
disoccup., senza ricerc. di un lavoro	5.5	6.6	5.8	15.4	18.7	16.3	6.8	3.1	6.1	2.6	2.0	2.5	2.4	0.4	0.8	5.4	4.9	5.2	248
rendita	7.8	11.5	8.9	2.7	5.3	3.4	1.4	3.1	1.7	0.1	1.3	0.3	16.5	10.1	11.6	5.0	8.9	6.3	297
incapacità di lavoro	5.8	5.4	5.7	10.6	9.3	10.3	4.8	18.8	7.3	1.5	2.0	1.6	0.0	1.8	1.4	4.7	5.2	4.9	232
casalinga/casalingo	0.2	5.0	1.7	0.0	1.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	0.2	1.2	2.2	1.9	0.2	3.4	1.2	56
altra	6.4	7.6	6.7	10.6	13.3	11.4	6.1	15.6	7.8	7.9	7.3	7.8	4.7	1.1	1.9	7.0	6.7	6.9	327
N**	1 715	754	2 469	188	75	263	147	32	179	775	150	925	85	276	361	3 248	1 500	4 748	4 748
<i>dati mancanti</i>	299	173	472	34	15	49	21	2	23	52	13	65	118	457	575	561	690	1 251	1 251

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T7 Reddito mensile netto e debiti dei pazienti all'entrata (in rapporto al problema principale) e dei parenti o conoscenti (2014)

	Pazienti: problema principale												Parenti o conoscenti			Tutti gli interventi			
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Reddito mensile netto (6 ultimi mesi)*																			
nessun reddito	46.8	50.9	48.0	60.0	66.7	61.7	42.6	50.0	43.4	48.4	69.0	51.1	97.4	87.5	90.6	51.5	63.1	54.9	756
fino a 1000 fr.	4.0	3.2	3.8	4.3	8.3	5.3	4.3	0.0	3.8	25.8	20.7	25.1	0.0	0.0	0.0	8.6	4.5	7.4	102
da 1001 a 2000 fr.	3.8	4.6	4.1	5.7	4.2	5.3	6.4	0.0	5.7	8.4	3.4	7.8	0.0	2.3	1.6	4.9	3.5	4.5	62
da 2001 a 3000 fr.	5.1	10.2	6.5	10.0	12.5	10.6	6.4	16.7	7.5	2.6	3.4	2.7	0.0	2.3	1.6	4.6	7.7	5.5	76
da 3001 a 4000 fr.	8.2	11.1	9.0	7.1	4.2	6.4	2.1	16.7	3.8	4.2	0.0	3.7	0.0	4.5	3.1	6.3	8.0	6.8	94
da 4001 a 5000 fr.	12.6	8.3	11.4	7.1	0.0	5.3	14.9	16.7	15.1	7.9	0.0	6.8	2.6	1.1	1.6	10.2	5.0	8.7	120
da 5001 a 6000 fr.	7.3	3.7	6.3	2.9	0.0	2.1	12.8	0.0	11.3	2.6	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	5.7	2.0	4.6	64
da 6001 a 8000 fr.	5.8	3.2	5.1	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	1.6	3.7	2.2	3.3	45
da 8001 a 10 000 fr.	4.6	3.2	4.2	2.9	4.2	3.2	6.4	0.0	5.7	0.0	3.4	0.5	0.0	0.0	0.0	3.3	3.2	3.3	45
da 10 001 a 15 000 fr.	1.1	0.9	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.5	0.7	9
più di 15 000 fr.	0.7	0.5	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.2	0.4	5
N**	549	216	765	70	24	94	47	6	53	190	29	219	39	88	127	977	401	1 378	1 378
<i>dati mancanti</i>	<i>1 465</i>	<i>711</i>	<i>2 176</i>	<i>152</i>	<i>66</i>	<i>218</i>	<i>121</i>	<i>28</i>	<i>149</i>	<i>637</i>	<i>134</i>	<i>771</i>	<i>164</i>	<i>645</i>	<i>809</i>	<i>2 832</i>	<i>1 789</i>	<i>4 621</i>	<i>4 621</i>
Debiti*																			
nessun debito	64.6	74.1	67.8	42.4	42.3	42.4	30.9	33.3	31.3	81.3	86.8	82.3	90.0	93.5	92.9	66.7	77.3	70.1	1 247
fino a 5000 fr.	4.2	4.3	4.3	3.0	0.0	2.2	10.9	11.1	10.9	4.7	3.9	4.6	0.0	2.2	1.8	4.7	3.5	4.3	77
da 5001 a 10 000 fr.	10.3	10.0	10.2	15.2	23.1	17.4	20.0	11.1	18.8	5.6	3.9	5.3	5.0	2.2	2.7	9.5	8.3	9.2	163
da 10 001 a 25 000 fr.	7.6	4.7	6.6	15.2	3.8	12.0	10.9	0.0	9.4	3.9	2.6	3.7	0.0	0.0	0.0	7.1	3.5	6.0	106
da 25 001 a 50 000 fr.	5.8	3.3	4.9	7.6	19.2	10.9	9.1	22.2	10.9	2.5	1.3	2.3	5.0	2.2	2.7	5.0	4.1	4.7	84
da 50 001 a 100 000 fr.	2.7	1.7	2.4	7.6	7.7	7.6	7.3	0.0	6.3	0.6	1.3	0.7	0.0	0.0	0.0	3.0	1.6	2.5	45
più di 100 000 fr.	1.7	0.3	1.2	3.0	0.0	2.2	5.5	0.0	4.7	0.8	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	1.7	0.2	1.2	22
importo sconosciuto	3.1	1.7	2.6	6.1	3.8	5.4	5.5	22.2	7.8	0.6	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	2.3	1.4	2.0	36
N**	590	301	891	66	26	92	55	9	64	359	76	435	20	92	112	1 215	565	1 780	1 780
<i>dati mancanti</i>	<i>1 424</i>	<i>626</i>	<i>2 050</i>	<i>156</i>	<i>64</i>	<i>220</i>	<i>113</i>	<i>25</i>	<i>138</i>	<i>468</i>	<i>87</i>	<i>555</i>	<i>183</i>	<i>641</i>	<i>824</i>	<i>2 594</i>	<i>1 625</i>	<i>4 219</i>	<i>4 219</i>

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T8 Incarcerazione o detenzione preventiva prima dell'entrata, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2014)

	Pazienti: problema principale												Tutti gli interventi			
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Incarcerazione o detenzione preventiva*																
nessuna	89.0	97.6	91.9	40.0	71.4	45.2	75.0	100.0	78.6	90.3	100.0	91.7	86.1	96.2	89.1	877
in prigione	3.6	0.8	2.7	20.0	14.3	19.0	4.2	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	3.9	1.4	3.2	31
in detenzione preventiva	4.8	1.6	3.7	14.3	14.3	14.3	12.5	0.0	10.7	6.8	0.0	5.8	5.9	2.1	4.8	47
in prigione e in detenzione preventiva	2.6	0.0	1.7	25.7	0.0	21.4	8.3	0.0	7.1	2.9	0.0	2.5	4.0	0.3	2.9	29
N**	502	248	750	35	7	42	24	4	28	103	18	121	692	292	984	984
<i>dati mancanti</i>	1 512	679	2 191	187	83	270	144	30	174	724	145	869	2 914	1 165	4 079	4 079
Durata totale di detenzione***																
fino a 1 mese	33.3	33.3	33.3	37.5	0.0	33.3	25.0	0.0	25.0	66.7	0.0	66.7	38.1	20.0	36.2	17
> 1 a 2 mesi	4.2	0.0	3.7	0.0	100.0	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	20.0	4.3	2
> 2 a 6 mesi	20.8	33.3	22.2	25.0	0.0	22.2	25.0	0.0	25.0	33.3	0.0	33.3	23.8	40.0	25.5	12
> 6 a 12 mesi	12.5	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	0.0	6.4	3
più di un anno	29.2	33.3	29.6	37.5	0.0	33.3	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	28.6	20.0	27.7	13
N**	24	3	27	8	1	9	4	0	4	6	0	6	42	5	47	47
<i>dati mancanti</i>	31	3	34	13	1	14	2	0	2	4	0	4	54	6	60	60

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

*** I risultati si basano solamente sui clienti che hanno vissuto un'esperienza di detenzione. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

T9 Istanza d'invio principale, secondo il problema principale e per i parenti o conoscenti (2014)

	Pazienti: problema principale												Parenti o conoscenti			Tutti gli interventi			
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Istanza d'invio principale*																			
condanna/misure	14.9	6.0	12.1	8.6	8.4	8.6	15.9	8.8	14.7	47.7	32.7	45.3	2.8	2.0	2.1	20.6	6.5	15.5	876
studio medico	10.7	12.5	11.3	11.0	8.4	10.3	3.8	8.8	4.7	2.4	2.0	2.3	1.1	3.8	3.2	7.7	8.2	7.9	446
istit. specializzata (dipendenze)	7.2	5.4	6.6	11.0	13.3	11.6	5.1	5.9	5.2	1.8	2.7	1.9	4.5	2.6	3.0	5.7	4.3	5.2	291
altro servizio medico/sociale/sanitario	15.6	16.1	15.8	13.9	14.5	14.0	7.0	17.6	8.9	7.6	4.7	7.1	5.6	3.2	3.7	12.2	10.3	11.5	649
istit. formatrice/educativa	0.5	0.8	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	2.7	3.4	1.1	0.3	0.5	1.3	0.9	1.2	67
datore di lavoro	3.8	2.0	3.2	0.0	1.2	0.3	0.6	2.9	1.0	2.3	0.0	1.9	1.1	1.1	1.1	2.7	1.4	2.3	127
propria iniziativa/famiglia/amici	43.8	53.0	46.7	52.2	50.6	51.7	63.1	55.9	61.8	27.7	48.0	30.9	81.0	84.5	83.7	45.0	64.0	51.9	2 925
altra	3.6	4.2	3.8	3.3	3.6	3.4	4.5	0.0	3.7	7.0	7.3	7.0	2.8	2.7	2.7	4.7	4.5	4.6	259
N**	1 916	871	2 787	209	83	292	157	34	191	788	150	938	179	663	842	3 603	2 037	5 640	5 640
<i>dati mancanti</i>	98	56	154	13	7	20	11	0	11	39	13	52	24	70	94	206	153	359	359

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T10 Intervento in seguito ad una misura giudiziaria e tipo di misura, secondo il problema principale (solo pazienti) (2014)

	Pazienti: problema principale												Tutti gli interventi			
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Intervento conseguente ad una misura giudiziaria*																
no, nessuna misura	86.4	95.0	89.1	87.5	90.0	88.2	85.5	94.1	87.1	67.0	68.0	67.1	83.0	92.5	85.6	1 931
sosp./rinuncia/avvert.(art. 19a c.2 LStup)	0.3	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	2.2	12.3	8.0	11.7	2.6	0.8	2.1	47
sì, consecutiva ad una misura	13.3	4.8	10.7	12.5	10.0	11.8	11.8	5.9	10.8	20.7	24.0	21.1	14.5	6.7	12.3	278
N**	1 030	462	1 492	104	40	144	76	17	93	300	50	350	1 632	624	2 256	2 256
<i>dati mancanti</i>	984	465	1 449	118	50	168	92	17	109	527	113	640	1 974	833	2 807	2 807
Tipo di misura giudiziaria***																
misure di prot. med. (art. 19a ch3 LStup)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
misure terapeutiche stazionarie (art. 59 CP)	1.0	0.0	0.8	16.7	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	1.6	3
tratt. residenz. di tossicodipendenza (art. 60)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
presa in carico ambulatoriale	21.9	18.8	21.5	50.0	100.0	57.1	100.0	0.0	100.0	48.5	42.9	47.5	30.6	30.8	30.6	56
sistemazione in istituzione per giovani adulti	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	14.3	7.5	1.9	3.8	2.2	4
in attesa di giudizio	1.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.1	0.0	10.0	5.1	0.0	4.4	8
altro	77.1	81.3	77.7	33.3	0.0	28.6	0.0	0.0	0.0	36.4	42.9	37.5	61.8	65.4	62.3	114
N**	105	16	121	6	1	7	4	0	4	33	7	40	157	26	183	183
<i>dati mancanti</i>	35	7	42	7	3	10	7	1	8	66	9	75	121	21	142	142

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali possono comprendere ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T11 Trattamenti/accompagnamenti anteriori l'ammissione e tipi di intervento, secondo il problema principale e per parenti o conoscenti (2014)

	Pazienti: problema principale												Parenti o conoscenti			Tutti gli interventi			N
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
Interventi precedenti*																			
no	47.5	41.6	45.7	13.7	13.9	13.8	43.4	36.4	42.2	74.2	72.9	74.0	66.7	71.9	71.0	53.1	50.1	52.1	2 563
sì	52.5	58.4	54.3	86.3	86.1	86.2	56.6	63.6	57.8	25.8	27.1	26.0	33.3	28.1	29.0	46.9	49.9	47.9	2 352
N**	1 868	848	2 716	211	79	290	152	33	185	739	144	883	51	242	293	3 351	1 564	4 915	4 915
<i>dati mancanti</i>	146	79	225	11	11	22	16	1	17	88	19	107	152	491	643	458	626	1 084	1 084
Tipo di intervento***																			
trattamento con prescriz. di eroina	1.2	0.5	1.0	9.3	8.8	9.2	3.8	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.9	1.6	26
terapia sostitut. (metadone, subutex)	4.3	3.8	4.1	58.8	70.6	61.8	5.7	30.0	9.5	2.5	8.0	3.4	12.5	1.6	3.8	9.5	8.1	9.1	145
altro tratt. medicam. delle dipendenze	7.3	7.1	7.2	9.3	14.7	10.7	9.4	10.0	9.5	1.6	8.0	2.7	0.0	0.0	0.0	6.8	7.3	7.0	112
consulenza ambulatoriale	72.8	73.9	73.2	69.1	67.6	68.7	83.0	80.0	82.5	83.6	80.0	83.0	93.8	84.4	86.3	75.0	75.9	75.3	1 207
struttura di giorno/clinica di giorno	1.8	2.7	2.1	3.1	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.8	4.0	1.4	0.0	0.0	0.0	1.5	1.9	1.7	27
terapia residenziale	48.6	53.8	50.4	43.3	32.4	40.5	47.2	50.0	47.6	17.2	44.0	21.8	31.3	21.9	23.8	42.2	46.2	43.6	699
cura di disintossicazione	40.1	46.7	42.4	47.4	50.0	48.1	34.0	40.0	34.9	15.6	20.0	16.3	18.8	15.6	16.3	35.6	38.1	36.5	584
gruppo di aiuto reciproco/ autosost.	5.1	7.1	5.8	4.1	0.0	3.1	1.9	0.0	1.6	2.5	0.0	2.0	6.3	0.0	1.3	4.4	5.5	4.8	77
altro-i	2.1	1.4	1.8	3.1	0.0	2.3	0.0	10.0	1.6	2.5	0.0	2.0	12.5	1.6	3.8	2.4	1.6	2.1	34
N**	673	364	1 037	97	34	131	53	10	63	122	25	147	16	64	80	1 037	565	1 602	1 602
<i>dati mancanti</i>	312	135	447	87	34	121	33	11	44	71	14	85	1	5	6	543	223	766	766

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

*** I risultati si basano solamente sui clienti che sono già stati presi in carico in precedenza. Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

T12 Trattamento sostitutivo o prescrizione di eroina al momento dell'ammissione, secondo il problema principale (solo pazienti) (2014)

	Pazienti: problema principale												Tutti i pazienti			
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Sostituzione o prescrizione di eroina al momento dell'ammissione*																
no	98.1	98.4	98.2	31.3	47.8	35.6	95.8	80.0	93.1	99.6	100.0	99.6	95.8	96.7	96.1	2 374
sì	1.9	1.6	1.8	68.7	52.2	64.4	4.2	20.0	6.9	0.4	0.0	0.4	4.2	3.3	3.9	97
N**	967	496	1 463	67	23	90	72	15	87	452	88	540	1 718	753	2 471	2 471
<i>dati mancanti</i>	1 047	431	1 478	155	67	222	96	19	115	375	75	450	1 888	704	2 592	2 592
Tipo di sostituzione/prescrizione***																
eroina	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	1.1	1
metadone	88.2	87.5	88.0	73.3	91.7	77.2	100.0	33.3	66.7	100.0	0.0	100.0	78.3	84.0	79.8	75
altri oppiacei	11.8	0.0	8.0	22.2	8.3	19.3	0.0	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	18.8	12.0	17.0	16
altre sostanze	0.0	12.5	4.0	2.2	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	4.0	2.1	2
N**	17	8	25	45	12	57	3	3	6	1	0	1	69	25	94	94
<i>dati mancanti</i>	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	3	0	3	3
Intervento di sostituzione nel corso della vita*																
no	96.2	96.6	96.3	33.5	31.5	32.9	95.7	72.0	91.5	98.6	97.4	98.4	91.3	91.2	91.3	2 966
sì	3.8	3.4	3.7	66.5	68.5	67.1	4.3	28.0	8.5	1.4	2.6	1.6	8.7	8.8	8.7	284
N**	1 334	648	1 982	185	73	258	116	25	141	439	77	516	2 287	963	3 250	3 250
<i>dati mancanti</i>	680	279	959	37	17	54	52	9	61	388	86	474	1 319	494	1 813	1 813
Età all'inizio del primo trattamento di sostituzione****																
media	29.1	28.1	28.8	27.3	26.3	27.1	35.3	21.5	29.8	29.7	29.5	29.6	28.1	26.9	27.8	
deviazione standard	8.7	4.9	7.6	7.3	6.4	7.1	10.0	2.1	10.4	6.5	7.8	6.0	7.8	5.6	7.3	
1° quartile	22.5	24.0	24.0	22.0	21.0	22.0	24.0	20.0	23.0	23.0	24.0	24.0	22.0	22.0	22.0	
mediana	27.5	27.0	27.0	25.0	24.0	25.0	39.0	21.5	24.0	30.0	29.5	30.0	25.5	26.0	26.0	
3° quartile	33.5	32.0	33.0	32.0	31.5	32.0	43.0	23.0	39.0	36.0	35.0	35.0	33.0	31.0	32.0	
N**	16	7	23	50	12	62	3	2	5	3	2	5	76	25	101	

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

*** I risultati si basano solamente sui clienti che seguono un programma di sostituzione o di prescrizione di eroina al momento dell'ammissione. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

**** I risultati si basano solamente sui clienti che hanno segnalato un'esperienza di sostituzione nel corso della vita

T13 Problema principale all'entrata (solamente pazienti) (2014)

Tutti i pazienti									
Problema principale	Uomini	Donne	Totale			Uomini	Donne	Totale	
	%	%	%	N		%	%	%	N
alcol	55.9	63.6	58.1	2 941	alcol	55.9	63.6	58.1	2 941
eroina	5.3	4.5	5.1	257					
metadone	0.6	1.1	0.8	39					
buprenorfina	0.1	0.1	0.1	3	oppioidi	6.2	6.2	6.2	312
fentanyl	0.0	0.0	0.0	0					
altri oppioidi	0.2	0.5	0.3	13					
cocaina	4.3	2.2	3.7	187					
crack	0.3	0.1	0.3	14	cocaina e derivati	4.7	2.3	4.0	202
altra forma di cocaina	0.0	0.0	0.0	1					
anfetamine	1.0	1.4	1.1	57					
metanfetamine	0.0	0.0	0.0	1					
MDMA e affini (ecstasy)	0.4	0.3	0.4	18	altri stimolanti	1.4	1.8	1.5	78
catinoni sintetici	0.0	0.0	0.0	0					
altri stimolanti	0.1	0.0	0.0	2					
barbiturici	0.0	0.0	0.0	0					
benzodiazepina	0.6	1.2	0.7	37	ipnotici/sedativi	0.7	1.4	0.9	44
GHB/GBL	0.1	0.0	0.0	2					
altri sonniferi e tranquillanti	0.1	0.2	0.1	5					
LSD	0.1	0.1	0.1	3					
ketamina	0.0	0.0	0.0	1	allucinogeni	0.1	0.1	0.1	6
altri allucinogeni	0.0	0.1	0.0	2					
canapa	22.9	11.2	19.6	990	canapa	22.9	11.2	19.6	990
tabacco	2.8	4.7	3.3	169	tabacco	2.8	4.7	3.3	169
sostanze volatili	0.0	0.1	0.0	2					
altra sostanza	0.4	0.3	0.4	20	altra/e sostanza/e	0.4	0.5	0.4	22
gioco patologico	2.5	1.2	2.1	107					
dipendenza al computer/Internet	1.6	0.4	1.2	63	problemi assimilabili a una dipendenza	5.0	8.2	5.9	299
disturbi alimentari	0.2	5.2	1.7	84					
altro/i problema/i di dipendenza	0.7	1.3	0.9	45					
N**	3 606	1 457	5 063	5 063		3 606	1 457	5 063	5 063
<i>dati mancanti</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T14 Uso di sostanze multiple e combinazioni di sostanze (2014)

Tutti i pazienti			
	Uomini	Donne	Totale
Problema legato all'uso di sostanze multiple secondo la CIM 10*			
sì	10.5	10.4	10.5
no	89.5	89.6	89.5
N**	1 625	603	2 228
<i>dati mancanti</i>	1 981	854	2 835
Combinazioni più frequenti di sostanze***			
can/alc	9.7	8.6	9.4
coc/alc	9.0	8.6	8.9
tab/alc	7.6	10.3	8.4
son/alc	4.1	17.2	7.9
tab/can/alc	6.9	1.7	5.4
can/coc	4.1	3.4	3.9
can/coc/alc	2.8	5.2	3.4
coc/op	2.8	3.4	3.0
son/op	2.8	3.4	3.0
op/alc	2.1	3.4	2.5
tab/op/alc	3.4	0.0	2.5
tab/coc/alc	1.4	5.2	2.5
coc/op/alc	2.1	1.7	2.0
son/op/alc	1.4	3.4	2.0
can/stim/alc	2.8	0.0	2.0
stim/coc/alc	0.7	3.4	1.5
can/stim	2.1	0.0	1.5
tab/can	1.4	1.7	1.5
tab/can/op/alc	1.4	1.7	1.5
tab/can/coc/op/alc	0.7	3.4	1.5
tab/can/stim/coc/alc	0.7	3.4	1.5
can/op	1.4	0.0	1.0
can/op/alc	1.4	0.0	1.0
tab/coc	1.4	0.0	1.0
tab/can/stim/coc	1.4	0.0	1.0
tab/can/stim/coc/op/alc	1.4	0.0	1.0
altre combinazioni	23.4	10.3	19.7
N**	145	58	203
<i>dati mancanti</i>	25	5	30

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

T15.1a Frequenza di consumo della principale sostanza problematica nel corso degli ultimi 30 giorni prima dell'entrata (2014), uomini

	Pazienti: principale sostanza problematica								
	Alcol	Oppioidi	Cocaina e derivati	Stimolanti	Ipnocici/sedativi	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze
Frequenza di consumo 30 ultimi giorni (%)*									
ogni giorno	40.5	39.8	12.0	19.5	58.3	0.0	31.8	88.8	75.0
4-6 giorni a settimana	13.0	5.6	12.8	0.0	8.3	0.0	6.7	1.3	0.0
2-3 giorni a settimana	13.9	14.3	22.4	17.1	0.0	0.0	16.5	1.3	25.0
max. 1 giorno a settimana	7.2	13.0	24.0	22.0	8.3	0.0	18.0	3.8	0.0
nessun consumo	25.3	27.3	28.8	41.5	25.0	0.0	27.0	5.0	0.0
N**	1 578	161	125	41	12	0	727	80	4
<i>dati mancanti</i>	436	61	43	11	12	4	100	20	11

T15.1b Frequenza di consumo della principale sostanza problematica nel corso degli ultimi 30 giorni prima dell'entrata (2014), donne

Frequenza di consumo 30 ultimi giorni (%)*									
ogni giorno	41.9	36.7	33.3	23.8	70.0	0.0	41.0	90.5	100.0
4-6 giorni a settimana	14.2	6.7	16.7	9.5	0.0	0.0	8.6	4.8	0.0
2-3 giorni a settimana	14.1	10.0	16.7	19.0	0.0	0.0	17.3	1.6	0.0
max. 1 giorno a settimana	9.0	13.3	12.5	19.0	10.0	50.0	18.7	1.6	0.0
nessun consumo	20.8	33.3	20.8	28.6	20.0	50.0	14.4	1.6	0.0
N**	745	60	24	21	10	2	139	63	2
<i>dati mancanti</i>	182	30	10	5	10	0	24	6	5

T15.1c Frequenza di consumo della principale sostanza problematica nel corso degli ultimi 30 giorni prima dell'entrata (2014), uomini e donne

Frequenza di consumo 30 ultimi giorni (%)*									
ogni giorno	40.9	38.9	15.4	21.0	63.6	0.0	33.3	89.5	83.3
4-6 giorni a settimana	13.4	5.9	13.4	3.2	4.5	0.0	7.0	2.8	0.0
2-3 giorni a settimana	14.0	13.1	21.5	17.7	0.0	0.0	16.6	1.4	16.7
max. 1 giorno a settimana	7.8	13.1	22.1	21.0	9.1	50.0	18.1	2.8	0.0
nessun consumo	23.9	29.0	27.5	37.1	22.7	50.0	24.9	3.5	0.0
N**	2 323	221	149	62	22	2	866	143	6
<i>dati mancanti</i>	618	91	53	16	22	4	124	26	16

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

T15.2a Frequenza di manifestazione del problema principale nel corso degli ultimi 30 giorni prima dell'entrata (2014), uomini

Patient-e-s: problème principal				
	Gioco patologico	Dipendenza al computer/Internet	Disturbi alimentari	Altri problemi assimilabili a una dipendenza
Frequenza di manifestazione 30 ultimi giorni (%)*				
ogni giorno	19.0	26.7	100.0	33.3
4 a 6 giorni alla settimana	6.3	0.0	0.0	0.0
2 a 3 giorni alla settimana	20.6	20.0	0.0	27.8
1 giorno alla settimana o meno	25.4	26.7	0.0	11.1
nessuna manifestazione	28.6	26.7	0.0	27.8
N**	63	15	6	18
<i>dati mancanti</i>	26	42	2	8

T15.2b Frequenza di manifestazione del problema principale nel corso degli ultimi 30 giorni prima dell'entrata (2014), donne

Frequenza di manifestazione 30 ultimi giorni (%)*				
ogni giorno	0.0	100.0	56.9	50.0
4 a 6 giorni alla settimana	16.7	0.0	13.8	16.7
2 a 3 giorni alla settimana	16.7	0.0	19.0	16.7
1 giorno alla settimana o meno	25.0	0.0	6.9	8.3
nessuna manifestazione	41.7	0.0	3.4	8.3
N**	12	2	58	12
<i>dati mancanti</i>	6	4	18	7

T15.2c Frequenza di manifestazione del problema principale nel corso degli ultimi 30 giorni prima dell'entrata (2014), uomini e donne

Frequenza di manifestazione 30 ultimi giorni (%)*				
ogni giorno	16.0	35.3	60.9	40.0
4 a 6 giorni alla settimana	8.0	0.0	12.5	6.7
2 a 3 giorni alla settimana	20.0	17.6	17.2	23.3
1 giorno alla settimana o meno	25.3	23.5	6.3	10.0
nessuna manifestazione	30.7	23.5	3.1	20.0
N**	75	17	64	30
<i>dati mancanti</i>	32	46	20	15

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

T16.1a Età all'epoca del primo consumo, all'inizio del consumo regolare, del consumo problematico e periodo di latenza (2014), uomini

Pazienti: principale sostanza problematica									
Uomini	Alcol	Oppioidi	Cocaina e derivati	Stimolanti	Ipnotici/sedativi	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze
Età all'epoca del primo consumo									
media	16.2	22.3	22.0	17.9	28.1	17.0	14.9	16.3	24.6
deviazione standard	3.6	7.2	7.0	3.6	10.1	.	2.4	3.8	7.7
1° quartile	14.0	17.0	18.0	16.0	17.5	17.0	14.0	14.0	20.0
mediana	16.0	20.0	20.0	17.0	27.5	17.0	15.0	15.0	22.0
3° quartile	17.0	26.0	24.0	19.0	37.0	17.0	16.0	18.0	30.0
N*	943	138	107	27	12	1	551	46	5
<i>dati mancanti</i>	1 071	84	61	25	12	3	276	54	10
Età all'inizio del consumo regolare									
media	21.9	23.0	24.5	20.7	16.5	.	15.9	19.3	.
deviazione standard	7.7	6.9	8.3	5.4	2.1	.	2.6	5.9	.
1° quartile	17.0	18.0	19.0	17.0	15.0	.	15.0	16.0	.
mediana	20.0	20.0	22.0	18.5	16.5	.	16.0	17.0	.
3° quartile	24.0	28.0	27.0	22.0	18.0	.	16.0	20.0	.
N*	725	78	62	18	2	0	363	43	0
<i>dati mancanti</i>	1 289	144	106	34	22	4	464	57	15
Età all'inizio del consumo problematico									
media	31.9	25.0	26.9	21.6	30.0	23.0	17.2	23.8	27.5
deviazione standard	12.6	7.5	8.0	6.2	10.3	.	4.5	11.6	10.4
1° quartile	21.0	19.0	20.5	17.0	18.0	23.0	15.0	16.0	20.0
mediana	30.0	23.0	25.0	19.0	29.0	23.0	16.0	20.0	26.5
3° quartile	40.0	30.0	32.5	27.5	40.0	23.0	17.0	28.0	34.5
N*	1 003	130	100	28	15	1	510	50	8
<i>dati mancanti</i>	1 011	92	68	24	9	3	317	50	7
Periodo di latenza (in anni)**									
media	26.2	7.6	9.5	4.2	5.0	.	4.7	14.6	6.7
deviazione standard	13.6	6.2	7.2	3.8	.	.	5.7	15.6	3.4
1° quartile	14.9	3.7	3.6	0.9	5.0	.	1.3	1.8	2.8
mediana	26.0	5.7	8.9	3.8	5.0	.	2.5	9.7	8.5
3° quartile	36.2	10.3	13.7	5.6	5.0	.	5.2	21.8	8.8
N*	445	16	51	16	1	0	397	28	3
<i>dati mancanti</i>	442	13	15	12	4	1	151	33	7

* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

** Lasso di tempo tra il primo consumo della sostanza problematica e l'inizio dell'intervento (solamente per le persone mai prese in carico in precedenza)

T16.1b Età all'epoca del primo consumo, all'inizio del consumo regolare, del consumo problematico e periodo di latenza (2014), donne

Pazienti: principale sostanza problematica									
Donne	Alcol	Oppioidi	Cocaina e derivati	Stimolanti	Ipnotici/sedativi	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze
Età all'epoca del primo consumo									
media	17.5	20.5	23.8	17.1	30.3	15.5	14.8	15.7	30.3
deviazione standard	5.8	7.9	8.7	2.4	12.4	0.7	2.6	2.9	25.8
1° quartile	15.0	16.0	16.0	16.0	16.0	15.0	14.0	14.0	13.0
mediana	16.0	18.0	20.5	16.5	30.0	15.5	14.0	15.0	18.0
3° quartile	18.0	22.0	30.5	19.0	37.0	16.0	16.0	17.0	60.0
N*	420	57	24	18	7	2	108	37	3
<i>dati mancanti</i>	507	33	10	8	13	0	55	32	4
Età all'inizio del consumo regolare									
media	26.5	21.5	25.6	18.6	31.6	16.0	17.4	20.4	16.5
deviazione standard	10.9	6.8	9.3	2.7	14.4	.	7.1	8.9	5.0
1° quartile	18.0	17.0	17.0	16.0	18.0	16.0	14.0	15.0	13.0
mediana	22.0	20.0	25.0	19.0	27.0	16.0	15.0	17.0	16.5
3° quartile	31.0	23.5	34.0	21.0	40.0	16.0	17.0	20.0	20.0
N*	329	28	15	8	7	1	71	33	2
<i>dati mancanti</i>	598	62	19	18	13	1	92	36	5
Età all'inizio del consumo problematico									
media	34.9	23.9	26.0	19.6	35.7	16.0	18.0	24.4	27.5
deviazione standard	12.8	8.6	9.8	5.2	14.3	.	6.8	10.9	10.6
1° quartile	25.0	18.0	16.0	17.0	24.0	16.0	15.0	16.0	20.0
mediana	35.0	21.0	25.0	17.5	37.0	16.0	16.0	20.0	27.5
3° quartile	45.0	28.0	35.0	21.0	50.0	16.0	18.0	30.0	35.0
N*	495	54	25	18	10	1	98	35	2
<i>dati mancanti</i>	432	36	9	8	10	1	65	34	5
Periodo di latenza (in anni)**									
media	26.1	4.1	4.9	3.7	14.1	.	4.8	19.7	32.9
deviazione standard	12.2	5.9	4.3	5.8	10.1	.	5.4	15.6	10.9
1° quartile	17.0	0.9	2.1	1.3	7.0	.	1.7	2.3	25.2
mediana	25.9	1.6	3.2	1.7	14.1	.	2.7	18.2	32.9
3° quartile	34.8	2.4	10.0	3.1	21.2	.	5.2	32.9	40.6
N*	166	9	11	11	2	0	77	22	2
<i>dati mancanti</i>	187	2	1	1	5	0	28	18	4

* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

** Lasso di tempo tra il primo consumo della sostanza problematica e l'inizio dell'intervento (solamente per le persone mai prese in carico in precedenza)

T16.1c Età all'epoca del primo consumo, all'inizio del consumo regolare, del consumo problematico e periodo di latenza (2014), uomini e donne

Pazienti: principale sostanza problematica									
<i>Uomini e donne</i>	Alcol	Oppioidi	Cocaina e derivati	Stimolanti	Ipnotici/sedativi	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze
Età all'epoca del primo consumo									
media	16.6	21.8	22.3	17.6	28.9	16.0	14.9	16.0	26.8
deviazione standard	4.5	7.4	7.4	3.2	10.7	1.0	2.4	3.4	15.3
1° quartile	15.0	17.0	18.0	16.0	17.0	15.0	14.0	14.0	17.0
mediana	16.0	19.0	20.0	17.0	30.0	16.0	15.0	15.0	21.0
3° quartile	18.0	25.0	25.0	19.0	37.0	17.0	16.0	17.0	32.5
N*	1 363	195	131	45	19	3	659	83	8
<i>dati mancanti</i>	1 578	117	71	33	25	3	331	86	14
Età all'inizio del consumo regolare									
media	23.3	22.6	24.7	20.1	28.2	16.0	16.1	19.8	16.5
deviazione standard	9.1	6.9	8.4	4.8	14.2	.	3.7	7.3	5.0
1° quartile	18.0	18.0	19.0	16.0	18.0	16.0	15.0	15.0	13.0
mediana	20.0	20.0	22.0	18.5	25.0	16.0	16.0	17.0	16.5
3° quartile	25.0	25.0	28.0	22.0	38.0	16.0	16.0	20.0	20.0
N*	1 054	106	77	26	9	1	434	76	2
<i>dati mancanti</i>	1 887	206	125	52	35	5	556	93	20
Età all'inizio del consumo problematico									
media	32.9	24.7	26.7	20.8	32.3	19.5	17.4	24.1	27.5
deviazione standard	12.7	7.8	8.3	5.9	12.1	5.0	5.0	11.3	9.9
1° quartile	22.0	19.0	20.0	17.0	24.0	16.0	15.0	16.0	20.0
mediana	30.0	22.0	25.0	18.5	30.0	19.5	16.0	20.0	26.5
3° quartile	40.0	30.0	33.0	23.0	40.0	23.0	17.0	30.0	35.0
N*	1 498	184	125	46	25	2	608	85	10
<i>dati mancanti</i>	1 443	128	77	32	19	4	382	84	12
Periodo di latenza (in anni)**									
media	26.2	6.4	8.7	4.0	11.1	.	4.7	16.8	17.2
deviazione standard	13.3	6.2	7.0	4.6	8.9	.	5.6	15.6	15.6
1° quartile	15.4	1.1	3.0	1.0	5.0	.	1.4	2.2	8.5
mediana	26.0	4.6	7.4	2.7	7.0	.	2.5	14.7	8.8
3° quartile	35.6	9.2	12.5	4.9	21.2	.	5.2	30.0	25.2
N*	611	25	62	27	3	0	474	50	5
<i>dati mancanti</i>	629	15	16	13	9	1	179	51	11

* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

** Lasso di tempo tra il primo consumo della sostanza problematica e l'inizio dell'intervento (solamente per le persone mai prese in carico in precedenza)

T16.2a Età all'epoca della prima manifestazione del problema principale, della manifestazione regolare, della manifestazione problematica e periodo di latenza (2014), uomini

Pazienti: problema principale					
<i>Uomini</i>	Gioco patologico	Dipendenza al computer/Internet	Disturbi alimentari	Altri problemi assimilabili a una dipendenza	
Età all'epoca della prima manifestazione					
media	23.6	18.3	19.0	23.5	
deviazione standard	9.4	9.8	8.5	15.5	
1° quartile	18.0	13.0	13.0	13.0	
mediana	21.0	14.0	19.0	17.0	
3° quartile	28.0	19.0	25.0	30.5	
N*	48	23	2	8	
<i>dati mancanti</i>	41	34	6	18	
Età all'inizio della manifestazione regolare					
media	24.8	17.6	19.5	25.0	
deviazione standard	7.6	5.1	7.8	10.0	
1° quartile	20.0	14.0	14.0	18.0	
mediana	22.0	16.0	19.5	22.5	
3° quartile	28.0	19.0	25.0	32.0	
N*	21	22	2	4	
<i>dati mancanti</i>	68	35	6	22	
Età all'inizio della manifestazione problematica					
media	28.4	21.4	20.8	24.6	
deviazione standard	10.4	10.0	5.7	14.4	
1° quartile	20.0	15.0	16.0	15.0	
mediana	26.0	16.5	21.5	19.0	
3° quartile	32.0	25.0	25.5	30.5	
N*	53	28	4	8	
<i>dati mancanti</i>	36	29	4	18	
Periodo di latenza (in anni)**					
media	8.2	6.4	.	11.1	
deviazione standard	6.1	5.9	.	9.1	
1° quartile	2.7	2.1	.	4.2	
mediana	8.7	4.8	.	8.5	
3° quartile	12.1	8.3	.	13.2	
N*	28	13	0	7	
<i>dati mancanti</i>	20	27	4	12	

* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

** Lasso di tempo tra la prima manifestazione del comportamento problematico e l'inizio dell'intervento (solamente per le persone mai prese in carico in precedenza)

T16.2b Età all'epoca della prima manifestazione del problema principale, della manifestazione regolare, della manifestazione problematica e periodo di latenza (2014), donne

Pazienti: problema principale				
Donne	Gioco patologico	Dipendenza al computer/Internet	Disturbi alimentari	Altri problemi assimilabili a una dipendenza
Età all'epoca della prima manifestazione				
media	41.3	35.0	18.1	24.1
deviazione standard	13.3	.	5.8	13.6
1° quartile	30.0	35.0	15.0	15.0
mediana	38.0	35.0	16.0	20.0
3° quartile	56.0	35.0	20.0	38.0
N*	3	1	45	7
<i>dati mancanti</i>	15	5	31	12
Età all'inizio della manifestazione regolare				
media	37.0	30.3	17.3	6.0
deviazione standard	6.4	14.5	3.6	.
1° quartile	32.0	16.0	15.0	6.0
mediana	37.0	30.0	17.0	6.0
3° quartile	40.0	45.0	18.0	6.0
N*	5	3	31	1
<i>dati mancanti</i>	13	3	45	18
Età all'inizio della manifestazione problematica				
media	42.1	35.0	19.3	27.6
deviazione standard	10.8	21.2	5.8	13.2
1° quartile	32.0	20.0	16.0	17.5
mediana	40.0	35.0	18.0	29.0
3° quartile	55.0	50.0	22.0	39.0
N*	7	2	45	8
<i>dati mancanti</i>	11	4	31	11
Periodo di latenza (in anni)**				
media	10.5	20.3	10.6	10.8
deviazione standard	2.6	.	11.6	13.3
1° quartile	8.2	20.3	1.6	0.1
mediana	10.0	20.3	5.6	6.7
3° quartile	13.3	20.3	15.3	25.7
N*	3	1	22	3
<i>dati mancanti</i>	8	4	16	6

* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

** Lasso di tempo tra la prima manifestazione del comportamento problematico e l'inizio dell'intervento (solamente per le persone mai prese in carico in precedenza)

T16.2c Età all'epoca della prima manifestazione del problema principale, della manifestazione regolare, della manifestazione problematica e periodo di latenza (2014), uomini et donne

Pazienti: problema principale					
<i>Uomini et donne</i>	Gioco patologico	Dipendenza al computer/Internet	Disturbi alimentari	Altri problemi assimilabili a una dipendenza	
Età all'epoca della prima manifestazione					
media	24.7	19.0	18.1	23.8	
deviazione standard	10.4	10.2	5.8	14.1	
1° quartile	18.0	13.0	14.0	14.0	
mediana	22.0	14.0	16.0	18.0	
3° quartile	30.0	20.0	20.0	38.0	
N*	51	24	47	15	
<i>dati mancanti</i>	56	39	37	30	
Età all'inizio della manifestazione regolare					
media	27.2	19.1	17.5	21.2	
deviazione standard	8.8	7.6	3.8	12.2	
1° quartile	20.0	15.0	15.0	16.0	
mediana	24.0	16.0	17.0	20.0	
3° quartile	31.0	20.0	18.0	25.0	
N*	26	25	33	5	
<i>dati mancanti</i>	81	38	51	40	
Età all'inizio della manifestazione problematica					
media	30.0	22.3	19.4	26.1	
deviazione standard	11.3	11.0	5.7	13.5	
1° quartile	20.5	15.0	16.0	15.5	
mediana	26.5	17.0	18.0	23.5	
3° quartile	36.5	25.0	23.0	37.0	
N*	60	30	49	16	
<i>dati mancanti</i>	47	33	35	29	
Periodo di latenza (in anni)**					
media	8.4	7.4	10.6	11.1	
deviazione standard	5.9	6.8	11.6	9.7	
1° quartile	2.7	2.1	1.6	4.2	
mediana	8.8	5.3	5.6	7.6	
3° quartile	12.7	10.2	15.3	13.2	
N*	31	14	22	10	
<i>dati mancanti</i>	28	31	20	18	

* Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

** Lasso di tempo tra la prima manifestazione del comportamento problematico e l'inizio dell'intervento (solamente per le persone mai prese in carico in precedenza)

T17 Modo di amministrazione della principale sostanza problematica prima dell'entrata (2014)

Pazienti: principale sostanza problematica															
Modo di amministrazione*	Eroina			Cocaina			Amfetamine			Canapa			Benzodiazepine		
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
iniettato	27.4	45.7	32.4	5.6	23.1	8.7	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0
fumato/inalato	40.3	30.4	37.6	12.9	7.7	12.0	13.0	11.8	12.5	97.6	99.3	97.9	0.0	0.0	0.0
ingerito /bevuto	5.6	4.3	5.3	2.4	0.0	2.0	34.8	23.5	30.0	0.7	0.7	0.7	92.9	100.0	96.3
sniffato	25.8	19.6	24.1	78.2	69.2	76.7	52.2	64.7	57.5	0.3	0.0	0.2	7.1	0.0	3.7
altro	0.8	0.0	0.6	0.8	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
N**	124	46	170	124	26	150	23	17	40	672	137	809	14	13	27
<i>dati mancanti</i>	67	20	87	31	6	37	13	4	17	155	26	181	6	4	10

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T18.1 Prevalenza a vita delle iniezioni, nel corso degli ultimi 30 giorni e degli ultimi 12 mesi prima dell'entrata, scambio di materiale d'iniezione, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2014)

	Pazienti: principale sostanza problematica												Tutti i pazienti			
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Iniezioni nel corso della vita*																
sì	4.5	3.8	4.3	54.0	67.7	57.8	12.5	31.0	16.3	1.9	1.6	1.9	7.4	7.6	7.5	275
no	94.6	95.5	94.9	42.3	32.3	39.6	85.7	65.5	81.6	97.6	98.4	97.7	91.5	91.5	91.5	3 372
non vuole rispondere	0.8	0.7	0.8	3.7	0.0	2.7	1.8	3.4	2.1	0.5	0.0	0.4	1.1	0.9	1.0	38
N**	1 438	706	2 144	163	62	225	112	29	141	630	124	754	2 583	1 102	3 685	3 685
<i>dati mancanti</i>	576	221	797	59	28	87	56	5	61	197	39	236	1 023	355	1 378	1 378
Iniezioni nel corso dei 12 ultimi mesi*																
sì	1.0	0.6	0.9	28.2	36.0	30.5	5.8	19.2	8.5	0.2	0.0	0.1	2.4	2.5	2.5	87
no	99.0	99.4	99.1	71.8	64.0	69.5	94.2	80.8	91.5	99.8	100.0	99.9	97.6	97.5	97.5	3 463
N**	1 404	690	2 094	124	50	174	104	26	130	622	122	744	2 487	1 063	3 550	3 550
<i>dati mancanti</i>	610	237	847	98	40	138	64	8	72	205	41	246	1 119	394	1 513	1 513
Iniezioni nel corso dei 30 ultimi giorni*																
sì	0.8	0.4	0.7	23.9	26.4	24.6	4.8	16.0	6.9	0.2	0.0	0.1	2.1	2.0	2.1	74
no	99.2	99.6	99.3	76.1	73.6	75.4	95.2	84.0	93.1	99.8	100.0	99.9	97.9	98.0	97.9	3 520
N**	1 421	698	2 119	134	53	187	105	25	130	625	123	748	2 518	1 076	3 594	3 594
<i>dati mancanti</i>	593	229	822	88	37	125	63	9	72	202	40	242	1 088	381	1 469	1 469
Scambio di materiale d'iniezione nel corso della vita***																
sì	43.8	20.0	38.1	23.8	80.0	41.9	80.0	66.7	75.0	50.0	0.0	50.0	37.3	57.9	42.9	30
no	50.0	60.0	52.4	71.4	10.0	51.6	0.0	33.3	12.5	50.0	0.0	50.0	56.9	31.6	50.0	35
non vuole rispondere	6.3	20.0	9.5	4.8	10.0	6.5	20.0	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	5.9	10.5	7.1	5
N**	16	5	21	21	10	31	5	3	8	4	0	4	51	19	70	70
<i>dati mancanti</i>	42	20	62	49	23	72	7	5	12	8	2	10	111	52	163	163
Scambio di materiale d'iniezione nel corso dei 12 ultimi mesi****																
sì	0.0	0.0	0.0	4.0	26.7	12.5	40.0	0.0	22.2	0.0	0.0	0.0	4.8	12.1	7.4	7
no	100.0	100.0	100.0	96.0	73.3	87.5	60.0	100.0	77.8	100.0	100.0	100.0	95.2	87.9	92.6	88
N**	26	11	37	25	15	40	5	4	9	5	1	6	62	33	95	95
<i>dati mancanti</i>	32	14	46	45	18	63	7	4	11	7	1	8	100	38	138	138
Scambio di materiale d'iniezione nel corso dei 30 ultimi giorni*****																
sì	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	3.7	1
no	100.0	100.0	100.0	100.0	83.3	93.8	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	88.9	96.3	26
N**	4	1	5	10	6	16	3	2	5	1	0	1	18	9	27	27
<i>dati mancanti</i>	54	24	78	60	27	87	9	6	15	11	2	13	144	62	206	206

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

*** I risultati si basano solamente sui clienti che si sono iniettati una sostanza illegale nel corso della vita. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

**** I risultati si basano solamente sui clienti che si sono iniettati una sostanza illegale nel corso dei 12 ultimi mesi. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

***** I risultati si basano solamente sui clienti che si sono iniettati una sostanza illegale nel corso dei 30 ultimi giorni. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

T18.2 Età all'epoca della prima iniezione, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2014)

	Pazienti: principale sostanza problematica												Tutti i pazienti			
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Età all'epoca della prima iniezione*																
fino a 14 anni	0.0	25.0	5.0	2.1	18.2	7.1	16.7	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	3.1	21.1	8.1	11
da 15 a 16 anni	12.5	0.0	10.0	4.2	13.6	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	7.9	6.6	9
da 17 a 18 anni	31.3	37.5	32.5	27.1	31.8	28.6	66.7	33.3	55.6	0.0	100.0	16.7	28.6	36.8	30.9	42
da 19 a 20 anni	31.3	0.0	25.0	12.5	4.5	10.0	0.0	0.0	0.0	60.0	0.0	50.0	21.4	2.6	16.2	22
da 21 a 25 anni	18.8	37.5	22.5	37.5	13.6	30.0	16.7	0.0	11.1	20.0	0.0	16.7	27.6	15.8	24.3	33
da 26 a 30 anni	3.1	0.0	2.5	4.2	4.5	4.3	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	16.7	5.1	5.3	5.1	7
da 31 a 39 anni	3.1	0.0	2.5	12.5	13.6	12.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.2	10.5	8.8	12
dai 40 anni in su	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
N**	32	8	40	48	22	70	6	3	9	5	1	6	98	38	136	136
<i>dati mancanti</i>	33	19	52	40	20	60	8	6	14	7	1	8	93	46	139	139

* I risultati si basano solamente sui clienti che si sono iniettati una sostanza illegale nel corso della loro vita. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T19.1a Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto alla principale sostanza problematica (2014), uomini

Uomini

	Pazienti: principale sostanza problematica									
	Alcol	Oppioidi	Cocaina e derivati	Stimolanti	Ipnotici/ sedativi	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze	
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Altri problemi*										
alcol	-	15.8	16.4	10.0	30.0	33.3	7.2	26.6	8.3	
eroina	0.9	1.9	5.7	2.0	20.0	33.3	0.6	1.1	0.0	
metadone	0.2	6.7	0.6	0.0	0.0	0.0	0.3	1.1	0.0	
buprenorfina	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
altri oppioidi	0.1	0.5	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
cocaina	2.3	14.4	2.5	6.0	10.0	33.3	3.4	5.3	0.0	
crack	0.2	0.5	1.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	
altra forma di cocaina	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	
anfetamine	0.5	1.4	4.4	2.0	0.0	33.3	1.4	2.1	0.0	
metanfetamine	0.2	0.5	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
MDMA e affini (ecstasy)	0.5	0.5	3.1	10.0	0.0	33.3	1.1	2.1	0.0	
catinoni sintetici	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
altri stimolanti	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
barbiturici	0.1	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.1	0.0	0.0	
benzodiazepina	0.9	8.1	1.9	0.0	10.0	0.0	0.1	2.1	0.0	
GHB/GBL	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	
altri sonniferi e tranquillanti	0.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
LSD	0.2	0.5	0.6	4.0	0.0	0.0	0.5	1.1	0.0	
ketamina	0.1	0.5	0.6	0.0	0.0	0.0	0.3	1.1	0.0	
altri allucinogeni	0.1	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	
canapa	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.1	0.0	
tabacco	4.8	14.8	16.4	14.0	10.0	66.7	-	20.2	0.0	
sostanze volatili	10.5	14.8	12.6	2.0	5.0	0.0	9.8	-	0.0	
altra sostanza	0.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	
gioco patologico	0.2	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	
dipendenza al computer/Internet	0.3	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.4	5.3	0.0	
disturbi alimentari	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
altro/i problema/i di dipendenza	0.2	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
nessuno	84.8	61.7	66.7	68.0	45.0	0.0	82.8	55.3	91.7	
N**	1 847	209	159	50	20	3	793	94	12	
<i>dati mancanti</i>	167	13	9	2	4	1	34	6	3	

* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

T19.1b Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto alla principale sostanza problematica (2014), donne

Donne

	Pazienti: principale sostanza problematica									
	Alcol	Oppioidi	Cocaina e derivati	Stimolanti	Ipnocici/sedativi	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze	
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Altri problemi*										
alcol	-	11.1	12.9	8.3	29.4	0.0	5.2	10.1	0.0	0.0
eroina	0.7	0.0	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
metadone	0.4	3.7	0.0	0.0	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
buprenorfina	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
altri oppioidi	0.4	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cocaina	0.7	13.6	0.0	20.8	5.9	0.0	3.2	4.3	0.0	0.0
crack	0.1	1.2	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
altra forma di cocaina	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
anfetamine	0.5	2.5	3.2	8.3	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0
metanfetamine	0.0	0.0	0.0	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MDMA e affini (ecstasy)	0.4	1.2	3.2	4.2	5.9	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0
catinoni sintetici	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
altri stimolanti	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
barbiturici	0.0	1.2	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
benzodiazepina	2.7	8.6	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0
GHB/GBL	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
altri sonniferi e tranquillanti	0.1	1.2	0.0	0.0	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LSD	0.0	1.2	0.0	4.2	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0
ketamina	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
altri allucinogeni	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
canapa	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
tabacco	2.7	14.8	9.7	16.7	5.9	0.0	-	10.1	16.7	16.7
sostanze volatili	8.7	17.3	6.5	12.5	11.8	0.0	9.7	-	16.7	16.7
altra sostanza	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
gioco patologico	0.0	1.2	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0
dipendenza al computer/Internet	0.1	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
disturbi alimentari	0.9	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7
altro/i problema/i di dipendenza	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
nessuno	84.8	67.9	67.7	62.5	52.9	100.0	85.2	81.2	83.3	83.3
N**	851	81	31	24	17	2	155	69	6	6
<i>dati mancanti</i>	<i>76</i>	<i>9</i>	<i>3</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>0</i>	<i>8</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>1</i>

* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

T19.1c Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto alla principale sostanza problematica (2014), uomini e donne

Uomini e donne

	Pazienti: principale sostanza problematica									
	Alcol	Oppioidi	Cocaina e derivati	Stimolanti	Ipnocici/sedativi	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze	
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Altri problemi*										
alcol	-	14.5	15.8	9.5	29.7	20.0	6.9	19.6	5.6	
eroina	0.8	1.4	5.8	1.4	10.8	20.0	0.5	0.6	0.0	
metadone	0.2	5.9	0.5	0.0	2.7	0.0	0.2	0.6	0.0	
buprenorfina	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
altri oppioidi	0.1	0.7	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	
cocaina	1.8	14.1	2.1	10.8	8.1	20.0	3.4	4.9	0.0	
crack	0.2	0.7	2.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	
altra forma di cocaina	0.0	0.7	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	
anfetamine	0.5	1.7	4.2	4.1	0.0	20.0	1.4	1.2	0.0	
metanfetamine	0.1	0.3	1.1	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
MDMA e affini (ecstasy)	0.5	0.7	3.2	8.1	2.7	20.0	1.5	1.2	0.0	
catinoni sintetici	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
altri stimolanti	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
barbiturici	0.0	0.3	0.5	0.0	2.7	0.0	0.1	0.0	0.0	
benzodiazepina	1.5	8.3	2.1	0.0	5.4	0.0	0.1	3.1	0.0	
GHB/GBL	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	
altri sonniferi e tranquillanti	0.1	0.7	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	
LSD	0.1	0.7	0.5	4.1	0.0	0.0	0.5	0.6	0.0	
ketamina	0.1	0.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	0.0	
altri allucinogeni	0.0	0.7	0.0	1.4	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	
canapa	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	0.0	
tabacco	4.1	14.8	15.3	14.9	8.1	40.0	-	16.0	5.6	
sostanze volatili	9.9	15.5	11.6	5.4	8.1	0.0	9.8	-	5.6	
altra sostanza	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	
gioco patologico	0.1	0.3	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	
dipendenza al computer/Internet	0.3	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.3	3.1	0.0	
disturbi alimentari	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	
altro/i problema/i di dipendenza	0.2	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
nessuno	84.8	63.4	66.8	66.2	48.6	40.0	83.2	66.3	88.9	
N**	2 698	290	190	74	37	5	948	163	18	
<i>dati mancanti</i>	243	22	12	4	7	1	42	6	4	

* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

T19.2a Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto al problema principale (non inerente a una sostanza) (2014), uomini

Uomini

	Pazienti: problema principale			
	Gioco patologico	Dipendenza al computer/Internet	Disturbi alimentari	Altri problemi assimilabili a una dipendenza
	%	%	%	%
Altri problemi*				
alcol	0.0	0.0	33.3	0.0
eroina	0.0	0.0	0.0	0.0
metadone	0.0	0.0	0.0	0.0
buprenorfina	0.0	0.0	0.0	0.0
fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0
altri oppioidi	0.0	0.0	0.0	0.0
cocaina	0.0	0.0	0.0	0.0
crack	0.0	0.0	0.0	0.0
altra forma di cocaina	0.0	0.0	0.0	0.0
anfetamine	0.0	0.0	0.0	0.0
metanfetamine	0.0	0.0	0.0	0.0
MDMA e affini (ecstasy)	0.0	0.0	0.0	0.0
catinoni sintetici	0.0	0.0	0.0	0.0
altri stimolanti	0.0	0.0	0.0	0.0
barbiturici	0.0	0.0	0.0	0.0
benzodiazepina	0.0	0.0	0.0	0.0
GHB/GBL	0.0	0.0	0.0	0.0
altri sonniferi e tranquillanti	0.0	0.0	0.0	0.0
LSD	0.0	0.0	0.0	0.0
ketamina	0.0	0.0	0.0	0.0
altri allucinogeni	0.0	0.0	0.0	0.0
canapa	0.0	0.0	0.0	0.0
tabacco	1.3	0.0	0.0	0.0
sostanze volatili	1.3	2.0	16.7	4.8
altra sostanza	0.0	0.0	16.7	0.0
gioco patologico	-	0.0	0.0	4.8
dipendenza al computer/Internet	7.5	-	0.0	4.8
disturbi alimentari	0.0	0.0	-	0.0
altro/i problema/i di dipendenza	0.0	60.0	0.0	-
nessuno	91.3	38.0	66.7	90.5
N**	80	50	6	21
<i>dati mancanti</i>	<i>9</i>	<i>7</i>	<i>2</i>	<i>5</i>

* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

T19.2b Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto al problema principale (non inerente a una sostanza) (2014), donne

Donne

Pazienti: problema principale				
	Gioco patologico	Dipendenza al computer/Internet	Disturbi alimentari	Altri problemi assimilabili a una dipendenza
	%	%	%	%
Altri problemi*				
alcol	7.1	0.0	0.0	0.0
eroina	0.0	0.0	0.0	0.0
metadone	0.0	0.0	0.0	0.0
buprenorfina	0.0	0.0	0.0	0.0
fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0
altri oppioidi	0.0	0.0	0.0	0.0
cocaina	0.0	0.0	0.0	0.0
crack	0.0	0.0	0.0	0.0
altra forma di cocaina	0.0	0.0	0.0	0.0
anfetamine	0.0	0.0	0.0	0.0
metanfetamine	0.0	0.0	0.0	0.0
MDMA e affini (ecstasy)	0.0	0.0	0.0	0.0
catinoni sintetici	0.0	0.0	0.0	0.0
altri stimolanti	0.0	0.0	0.0	0.0
barbiturici	0.0	0.0	0.0	0.0
benzodiazepina	0.0	0.0	0.0	0.0
GHB/GBL	0.0	0.0	0.0	0.0
altri sonniferi e tranquillanti	0.0	0.0	0.0	0.0
LSD	0.0	0.0	0.0	0.0
ketamina	0.0	0.0	0.0	0.0
altri allucinogeni	0.0	0.0	0.0	0.0
canapa	0.0	0.0	0.0	0.0
tabacco	0.0	0.0	0.0	0.0
sostanze volatili	0.0	0.0	1.5	0.0
altra sostanza	0.0	0.0	0.0	0.0
gioco patologico	-	0.0	0.0	0.0
dipendenza al computer/Internet	0.0	-	0.0	0.0
disturbi alimentari	0.0	0.0	-	0.0
altro/i problema/i di dipendenza	0.0	60.0	0.0	-
nessuno	92.9	40.0	98.5	100.0
N**	14	5	65	15
<i>dati mancanti</i>	<i>4</i>	<i>1</i>	<i>11</i>	<i>4</i>

* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

T19.2c Altri problemi di dipendenza all'entrata, in rapporto al problema principale (non inerente a una sostanza) (2014),
uomini e donne

Uomini e donne

Pazienti: problema principale				
	Gioco patologico	Dipendenza al computer/Internet	Disturbi alimentari	Altri problemi assimilabili a una dipendenza
	%	%	%	%
Altri problemi*				
alcol	1.1	0.0	2.8	0.0
eroina	0.0	0.0	0.0	0.0
metadone	0.0	0.0	0.0	0.0
buprenorfina	0.0	0.0	0.0	0.0
fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0
altri oppioidi	0.0	0.0	0.0	0.0
cocaina	0.0	0.0	0.0	0.0
crack	0.0	0.0	0.0	0.0
altra forma di cocaina	0.0	0.0	0.0	0.0
anfetamine	0.0	0.0	0.0	0.0
metanfetamine	0.0	0.0	0.0	0.0
MDMA e affini (ecstasy)	0.0	0.0	0.0	0.0
catinoni sintetici	0.0	0.0	0.0	0.0
altri stimolanti	0.0	0.0	0.0	0.0
barbiturici	0.0	0.0	0.0	0.0
benzodiazepina	0.0	0.0	0.0	0.0
GHB/GBL	0.0	0.0	0.0	0.0
altri sonniferi e tranquillanti	0.0	0.0	0.0	0.0
LSD	0.0	0.0	0.0	0.0
ketamina	0.0	0.0	0.0	0.0
altri allucinogeni	0.0	0.0	0.0	0.0
canapa	0.0	0.0	0.0	0.0
tabacco	1.1	0.0	0.0	0.0
sostanze volatili	1.1	1.8	2.8	2.8
altra sostanza	0.0	0.0	1.4	0.0
gioco patologico	-	0.0	0.0	2.8
dipendenza al computer/Internet	6.4	-	0.0	2.8
disturbi alimentari	0.0	0.0	-	0.0
altro/i problema/i di dipendenza	0.0	60.0	0.0	-
nessuno	91.5	38.2	95.8	94.4
N**	94	55	71	36
<i>dati mancanti</i>	13	8	13	9

* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

T20.1a Frequenza del consumo delle sostanze secondarie secondo il problema principale (solo pazienti) (2014)

	Pazienti: problema principale												comportamenti comparabili ad una dipendenza			Tutti i problemi principali			N
	Uomini			Donne			Totale			Uomini			Donne			Totale			
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Alcool*	Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Ipnotici/sedativi			Comp. comparabili ad una dip.						
ogni giorno	39.3	14.3	34.3	25.0	0.0	21.7	18.4	14.3	17.9	25.0	0.0	16.7	100.0	0.0	100.0	26.9	16.0	25.2	39
4-6 giorni a settimana	3.6	0.0	2.9	20.0	0.0	17.4	6.1	14.3	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	4.0	5.8	9
2-3 giorni a settimana	7.1	42.9	14.3	15.0	0.0	13.0	22.4	42.9	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.6	28.0	16.8	26
max. 1 giorno a settimana	25.0	28.6	25.7	30.0	33.3	30.4	32.7	28.6	32.1	0.0	50.0	16.7	0.0	0.0	0.0	27.7	28.0	27.7	43
nessun consumo	25.0	14.3	22.9	10.0	66.7	17.4	20.4	0.0	17.9	75.0	50.0	66.7	0.0	0.0	0.0	24.6	24.0	24.5	38
N**	28	7	35	20	3	23	49	7	56	4	2	6	2	0	2	130	25	155	155
<i>dati mancanti</i>	194	83	277	148	31	179	778	156	934	20	18	38	178	119	297	3 679	2 165	5 844	5 844
Opioïdes*	Alcol			Cocaina e derivati			Canapa			Ipnotici/sedativi			Comp. comparabili ad una dip.						
ogni giorno	15.4	0.0	11.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	11.5	0.0	10.0	3
4-6 giorni a settimana	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
2-3 giorni a settimana	0.0	0.0	0.0	66.7	0.0	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.4	0.0	13.3	4
max. 1 giorno a settimana	38.5	25.0	35.3	16.7	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.1	25.0	23.3	7
nessun consumo	46.2	75.0	52.9	16.7	0.0	16.7	100.0	0.0	100.0	66.7	0.0	66.7	0.0	0.0	0.0	50.0	75.0	53.3	16
N**	13	4	17	6	0	6	2	0	2	3	0	3	0	0	0	26	4	30	30
<i>dati mancanti</i>	2 001	923	2 924	162	34	196	825	163	988	21	20	41	180	119	299	3 783	2 186	5 969	5 969
Cocaïne et dérivés*	Alcol			Oppioidi			Canapa			Ipnotici/sedativi			Comp. comparabili ad una dip.						
ogni giorno	0.0	25.0	2.6	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	4.5	2.9	3
4-6 giorni a settimana	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	1.0	1
2-3 giorni a settimana	5.9	25.0	7.9	26.3	12.5	22.2	4.5	20.0	7.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.6	18.2	11.4	12
max. 1 giorno a settimana	32.4	50.0	34.2	21.1	25.0	22.2	31.8	60.0	37.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.7	36.4	29.5	31
nessun consumo	61.8	0.0	55.3	52.6	62.5	55.6	59.1	20.0	51.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	59.0	40.9	55.2	58
N**	34	4	38	19	8	27	22	5	27	1	0	1	0	0	0	83	22	105	105
<i>dati mancanti</i>	1 980	923	2 903	203	82	285	805	158	963	23	20	43	180	119	299	3 726	2 168	5 894	5 894
Cannabis*	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Ipnotici/sedativi			Comp. comparabili ad una dip.						
ogni giorno	32.9	44.4	35.1	44.0	33.3	41.2	45.8	33.3	44.4	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	35.1	36.6	35.4	69
4-6 giorni a settimana	10.5	16.7	11.7	16.0	11.1	14.7	12.5	0.0	11.1	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	13.6	12.2	13.3	26
2-3 giorni a settimana	14.5	11.1	13.8	20.0	33.3	23.5	12.5	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.6	17.1	15.9	31
max. 1 giorno a settimana	13.2	22.2	14.9	8.0	0.0	5.9	8.3	0.0	7.4	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0	13.6	12.2	13.3	26
nessun consumo	28.9	5.6	24.5	12.0	22.2	14.7	20.8	66.7	25.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.1	22.0	22.1	43
N**	76	18	94	25	9	34	24	3	27	2	0	2	1	0	1	154	41	195	195
<i>dati mancanti</i>	1 938	909	2 847	197	81	278	144	31	175	22	20	42	179	119	298	3 655	2 149	5 804	5 804

* Come problema secondario. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali possono comprendere anche le persone il cui sesso non è conosciuto.

T20.1b Frequenza del consumo delle sostanze secondarie secondo il problema principale (solo pazienti) (2014)

	Pazienti: problema principale															Tutti i pazienti			
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			comportamenti comparabili ad una dipendenza			Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
Autres stimulants*																			
ogni giorno	12.5	33.3	18.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0	7.4	20.0	9.4	3
4-6 giorni a settimana	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
2-3 giorni a settimana	25.0	0.0	18.2	0.0	0.0	0.0	16.7	0.0	16.7	11.1	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0	14.8	0.0	12.5	4
max 1 giorno a settimana	12.5	66.7	27.3	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	33.3	44.4	50.0	45.5	0.0	0.0	0.0	25.9	60.0	31.3	10
nessun consumo	50.0	0.0	36.4	100.0	0.0	100.0	50.0	0.0	50.0	33.3	50.0	36.4	0.0	0.0	0.0	51.9	20.0	46.9	15
N**	8	3	11	3	0	3	6	0	6	9	2	11	0	0	0	27	5	32	32
<i>dati mancanti</i>	2 006	924	2 930	219	90	309	162	34	196	818	161	979	180	119	299	3 782	2 185	5 967	5 967
Hypnotiques/sédatifs*																			
ogni giorno	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
4-6 giorni a settimana	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
2-3 giorni a settimana	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
max 1 giorno a settimana	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
nessun consumo	100.0	0.0	100.0	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	100.0	2
N**	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2
<i>dati mancanti</i>	2 013	927	2 940	222	89	311	168	34	202	827	163	990	180	119	299	3 808	2 189	5 997	5 997
Hallucinogènes*																			
ogni giorno	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
4-6 giorni a settimana	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
2-3 giorni a settimana	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
max 1 giorno a settimana	33.3	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	30.0	0.0	23.1	3
nessun consumo	66.7	0.0	66.7	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	66.7	100.0	75.0	0.0	0.0	0.0	70.0	100.0	76.9	10
N**	3	0	3	1	1	2	0	0	0	3	1	4	0	0	0	10	3	13	13
<i>dati mancanti</i>	2 011	927	2 938	221	89	310	168	34	202	824	162	986	180	119	299	3 799	2 187	5 986	5 986
Autres substances*																			
ogni giorno	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
4-6 giorni a settimana	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
2-3 giorni a settimana	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	25.0	1
max 1 giorno a settimana	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
nessun consumo	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	66.7	100.0	75.0	3
N**	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	3	1	4	4
<i>dati mancanti</i>	2 014	926	2 940	222	90	312	168	34	202	825	163	988	180	119	299	3 806	2 189	5 995	5 995

* Come problema secondario. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

T21 Frequenza del consumo di alcol, numero di "bicchieri standard" al giorno e frequenza di forti consumi di alcol prima dell'entrata, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2014)

	Pazienti: problema principale												Tutti i problemi principali			
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Frequenza del consumo di alcol*																
mai	11.6	9.2	10.8	10.4	20.8	13.2	13.0	18.2	13.8	19.0	21.5	19.4	14.2	13.1	13.9	372
1 volta al mese o meno	1.6	3.8	2.3	17.9	20.8	18.7	10.1	9.1	10.0	26.8	27.8	26.9	9.2	8.2	8.9	239
2 a 4 volte al mese	6.0	7.3	6.4	22.4	25.0	23.1	26.1	45.5	28.8	33.9	38.0	34.5	14.5	13.1	14.1	376
2 a 3 volte alla settimana	17.9	17.7	17.8	17.9	16.7	17.6	27.5	27.3	27.5	14.9	8.9	14.0	17.6	17.0	17.4	465
4 volte alla settimana o più	63.0	61.9	62.7	31.3	16.7	27.5	23.2	0.0	20.0	5.5	3.8	5.2	44.5	48.5	45.7	1 220
N**	1 208	586	1 794	67	24	91	69	11	80	422	79	501	1 895	777	2 672	2 672
<i>dati mancanti</i>	806	341	1 147	155	66	221	99	23	122	405	84	489	1 711	680	2 391	2 391
Numero di "bicchieri standard" al giorno***																
1 o 2	6.2	5.8	6.1	44.6	44.4	44.6	42.0	42.9	42.1	51.6	65.3	53.4	19.5	16.5	18.6	405
3 o 4	19.2	18.3	18.9	25.0	16.7	23.0	26.0	42.9	28.1	32.8	22.4	31.4	23.8	19.1	22.5	489
5 o 6	22.9	25.0	23.6	17.9	11.1	16.2	18.0	14.3	17.5	11.8	6.1	11.0	19.3	21.3	19.9	432
7 o 9	21.9	26.8	23.5	5.4	16.7	8.1	10.0	0.0	8.8	0.6	4.1	1.1	15.8	22.8	17.8	387
10 o più	29.8	24.2	28.0	7.1	11.1	8.1	4.0	0.0	3.5	3.2	2.0	3.0	21.6	20.2	21.2	462
N**	1 045	504	1 549	56	18	74	50	7	57	314	49	363	1 552	623	2 175	2 175
<i>dati mancanti</i>	969	423	1 392	166	72	238	118	27	145	513	114	627	2 054	834	2 888	2 888
Frequenza di forti consumi di alcol***																
mai	14.2	14.2	14.2	29.3	55.6	35.5	37.0	62.5	40.3	60.8	66.7	61.6	28.0	27.3	27.8	659
meno di una volta al mese	8.5	9.1	8.7	36.2	11.1	30.3	22.2	0.0	19.4	22.9	20.0	22.5	13.9	10.2	12.8	304
1 volta al mese	12.2	9.7	11.4	8.6	11.1	9.2	14.8	37.5	17.7	9.4	6.7	9.0	11.3	9.1	10.6	252
1 volta alla settimana	26.6	29.0	27.4	17.2	5.6	14.5	14.8	0.0	12.9	5.2	5.0	5.2	20.3	23.4	21.2	502
quasi ogni giorno	38.4	38.1	38.3	8.6	16.7	10.5	11.1	0.0	9.7	1.7	1.7	1.7	26.7	30.1	27.6	656
N**	1 104	528	1 632	58	18	76	54	8	62	362	60	422	1 688	685	2 373	2 373
<i>dati mancanti</i>	910	399	1 309	164	72	236	114	26	140	465	103	568	1 918	772	2 690	2 690

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

*** I risultati si basano solamente sui clienti che hanno indicato un consumo d'alcol. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

T22 Frequenza del consumo di tabacco e numero di sigarette al giorno nel corso dei 30 ultimi giorni prima dell'entrata, in rapporto al problema principale (solamente pazienti)

	Pazienti: problema principale												Tutti i pazienti			
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Frequenza del consumo di tabacco*																
mai	34.1	38.5	35.5	6.1	7.4	6.4	19.1	10.0	17.9	21.6	16.5	20.8	28.5	33.7	30.0	690
1 giorno alla settimana o meno	0.9	0.5	0.8	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.3	3.1	3.5	3.2	1.5	0.9	1.3	30
2 a 3 giorni alla settimana	0.7	0.7	0.7	1.2	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	6.0	3.5	5.6	2.3	1.1	1.9	44
4 a 6 giorni alla settimana	0.3	0.7	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.7	0.8	0.8	0.8	18
1 volta al giorno	2.9	0.7	2.2	8.5	11.1	9.2	2.9	0.0	2.6	3.5	1.2	3.2	3.3	1.2	2.7	62
più volte al giorno	61.1	58.9	60.4	84.1	81.5	83.5	76.5	90.0	78.2	63.8	75.3	65.6	63.7	62.4	63.3	1 456
N**	877	418	1 295	82	27	109	68	10	78	453	85	538	1 641	659	2 300	2 300
<i>dati mancanti</i>	1 137	509	1 646	140	63	203	100	24	124	374	78	452	1 965	798	2 763	2 763
Numero di sigarette al giorno***																
0 a 10	16.1	19.3	17.1	11.6	13.0	12.0	22.0	28.6	22.9	54.7	49.2	53.8	28.2	24.7	27.3	392
11 a 20	42.9	51.6	45.5	52.2	52.2	52.2	46.3	42.9	45.8	37.0	44.4	38.2	41.6	49.5	43.7	629
21 a 30	31.1	20.2	27.8	30.4	26.1	29.3	26.8	14.3	25.0	5.8	6.3	5.9	22.3	17.0	20.9	300
31 o più	9.9	9.0	9.6	5.8	8.7	6.5	4.9	14.3	6.3	2.4	0.0	2.1	7.9	8.8	8.1	117
N**	515	223	738	69	23	92	41	7	48	327	63	390	1 050	388	1 438	1 438
<i>dati mancanti</i>	63	34	97	8	2	10	14	2	16	28	8	36	123	49	172	172

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

*** I risultati si basano solamente sui clienti che hanno indicato un consumo di tabacco. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

T23a Obiettivo di consumo all'entrata quanto alla principale sostanza problematica (2014), uomini

Pazienti: principale sostanza problematica									
	Alcol	Oppioidi	Cocaina e derivati	Stimolanti	Medicamenti	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Obiettivo di consumo*									
astinenza definitiva	29.1	83.1	70.2	80.0	75.0	0.0	51.1	44.8	33.3
astinenza limitata nel tempo	21.9	4.6	2.1	20.0	25.0	0.0	7.8	17.2	0.0
consumo controllato	33.7	6.2	12.8	0.0	0.0	0.0	24.8	13.8	33.3
non è prevista nessuna limitazione	1.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0
nessuna decisione finora	14.0	6.2	12.8	0.0	0.0	0.0	14.2	24.1	33.3
altro	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
N*	685	65	47	5	4	0	141	29	3
<i>dati mancanti</i>	1 329	157	121	47	20	4	686	71	12

T23b Obiettivo di consumo all'entrata quanto alla principale sostanza problematica (2014), donne

Obiettivo di consumo*									
astinenza definitiva	33.8	81.8	85.7	0.0	57.1	0.0	59.1	70.0	100.0
astinenza limitata nel tempo	16.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.6	0.0	0.0
consumo controllato	32.8	4.5	14.3	100.0	14.3	0.0	4.5	0.0	0.0
non è prevista nessuna limitazione	0.7	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	13.6	10.0	0.0
nessuna decisione finora	16.4	9.1	0.0	0.0	28.6	0.0	9.1	20.0	0.0
altro	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
N*	299	22	7	1	7	0	22	10	2
<i>dati mancanti</i>	628	68	27	25	13	2	141	59	5

T23c Obiettivo di consumo all'entrata quanto alla principale sostanza problematica (2014), uomini e donne

Obiettivo di consumo*									
astinenza definitiva	30.5	82.8	72.2	66.7	63.6	0.0	52.1	51.3	60.0
astinenza limitata nel tempo	20.2	3.4	1.9	16.7	9.1	0.0	8.6	12.8	0.0
consumo controllato	33.4	5.7	13.0	16.7	9.1	0.0	22.1	10.3	20.0
non è prevista nessuna limitazione	0.9	1.1	1.9	0.0	0.0	0.0	3.7	2.6	0.0
nessuna decisione finora	14.7	6.9	11.1	0.0	18.2	0.0	13.5	23.1	20.0
altro	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
N*	984	87	54	6	11	0	163	39	5
<i>dati mancanti</i>	1 957	225	148	72	33	6	827	130	17

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

T24a Problemi psichici nel corso della vita (2014), uomini

Uomini

	Pazienti: problema principale								
	Alcol	Oppioidi	Cocaina e derivati	Stimolanti	Medicamenti	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Problemi psichici*									
auto devalorizzazione o senso di colpa	31.6	29.8	30.0	0.0	40.0	0.0	15.9	35.3	0.0
stato ansioso/nervoso importante	28.4	42.1	37.5	0.0	60.0	0.0	20.4	47.1	20.0
difficoltà di comprensione/memoria	15.9	12.3	20.0	33.3	40.0	0.0	15.9	17.6	0.0
alterazione dell'attenzione o iperattività	13.1	7.0	27.5	33.3	40.0	0.0	11.5	11.8	0.0
pensieri o azioni compulsive	2.2	3.5	5.0	0.0	0.0	0.0	2.7	2.9	0.0
reaz. acuta da stress/ disturbi dell'adattamento	4.3	3.5	5.0	0.0	0.0	0.0	1.8	2.9	0.0
allucinazioni	2.2	10.5	2.5	0.0	0.0	0.0	6.2	8.8	0.0
diff. a controllare comp. violenti	10.4	5.3	12.5	33.3	20.0	0.0	11.5	11.8	0.0
problemi psichici curati con medicine	22.2	28.1	22.5	0.0	100.0	0.0	16.8	35.3	20.0
pensieri suicidari important	9.8	7.0	7.5	0.0	20.0	0.0	8.8	14.7	20.0
tentativi di suicidio	2.9	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	8.8	0.0
altro/i problema/i psichico/i	2.2	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0
nessuno	41.0	43.9	35.0	66.7	0.0	0.0	57.5	26.5	60.0
N**	490	57	40	3	5	0	113	34	5
<i>dati mancanti</i>	<i>1 524</i>	<i>165</i>	<i>128</i>	<i>49</i>	<i>19</i>	<i>4</i>	<i>714</i>	<i>66</i>	<i>10</i>

* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

T24b Problemi psichici nel corso della vita (2014), donne

Donne

	Pazienti: problema principale								
	Alcol	Oppioidi	Cocaina e derivati	Stimolanti	Medicamenti	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Problemi psichici*									
auto devalorizzazione o senso di colpa	45.6	33.3	40.0	0.0	77.8	0.0	16.7	54.5	100.0
stato ansioso/nervoso importante	45.1	47.6	60.0	0.0	55.6	0.0	27.8	45.5	100.0
difficoltà di comprensione/memoria	16.7	33.3	0.0	0.0	33.3	0.0	11.1	45.5	33.3
alterazione dell'attenzione o iperattività	12.1	28.6	0.0	0.0	33.3	0.0	5.6	45.5	33.3
pensieri o azioni compulsive	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	0.0
reaz. acuta da stress/ disturbi dell'adattamento	9.3	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	0.0
allucinazioni	0.5	4.8	20.0	0.0	0.0	0.0	16.7	18.2	0.0
diff. a controllare comp. violenti	7.4	28.6	0.0	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	33.3
problemi psichici curati con medicine	41.4	57.1	80.0	0.0	100.0	0.0	38.9	63.6	33.3
pensieri suicidari important	11.2	14.3	0.0	0.0	55.6	0.0	22.2	18.2	66.7
tentativi di suicidio	6.5	4.8	0.0	0.0	33.3	0.0	5.6	9.1	33.3
altro/i problema/i psichico/i	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	0.0
nessuno	16.3	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	27.3	0.0
N**	215	21	5	0	9	0	18	11	3
<i>dati mancanti</i>	<i>712</i>	<i>69</i>	<i>29</i>	<i>26</i>	<i>11</i>	<i>2</i>	<i>145</i>	<i>58</i>	<i>4</i>

* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

T24c Problemi psichici nel corso della vita (2014), uomini e donne

Uomini e donne

Pazienti: problema principale									
	Alcol	Oppioidi	Cocaina e derivati	Stimolanti	Medicamenti	Allucinogeni	Canapa	Tabacco	Altre sostanze
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Problemi psichici*									
auto devalorizzazione o senso di colpa	35.9	30.8	31.1	0.0	64.3	0.0	16.0	40.0	37.5
stato ansioso/nervoso importante	33.5	43.6	40.0	0.0	57.1	0.0	21.4	46.7	50.0
difficoltà di comprensione/memoria	16.2	17.9	17.8	33.3	35.7	0.0	15.3	24.4	12.5
alterazione dell'attenzione o iperattività	12.8	12.8	24.4	33.3	35.7	0.0	10.7	20.0	12.5
pensieri o azioni compulsive	2.1	2.6	4.4	0.0	0.0	0.0	3.1	2.2	0.0
reaz. acuta da stress/ disturbi dell'adattamento	5.8	3.8	4.4	0.0	0.0	0.0	2.3	2.2	0.0
allucinazioni	1.7	9.0	4.4	0.0	0.0	0.0	7.6	11.1	0.0
diff. a controllare comp. violenti	9.5	11.5	11.1	33.3	14.3	0.0	9.9	8.9	12.5
problemi psichici curati con medicine	28.1	35.9	28.9	0.0	100.0	0.0	19.8	42.2	25.0
pensieri suicidari important	10.2	9.0	6.7	0.0	42.9	0.0	10.7	15.6	37.5
tentativi di suicidio	4.0	5.1	0.0	0.0	21.4	0.0	3.8	8.9	12.5
altro/i problema/i psichico/i	3.4	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0
nessuno	33.5	37.2	31.1	66.7	0.0	0.0	54.2	26.7	37.5
N**	705	78	45	3	14	0	131	45	8
<i>dati mancanti</i>	2 236	234	157	75	30	6	859	124	14

* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

T25 Parenti/conoscenti: legame tra l'utente e la persona sintomatica (2014)

Parenti o conoscenti				
	Uomini	Donne	Totale	
	%	%	%	N
L'utente è... *				
madre/padre	41.7	34.0	35.7	318
figlio/figlia	15.1	12.6	13.1	117
sorella/fratello	3.1	3.9	3.7	33
partner	30.7	41.8	39.4	351
altro parente	3.1	2.4	2.6	23
collega/amico/a	3.6	2.4	2.7	24
datore di lavoro/docente	0.0	0.6	0.4	4
tutore/curatore	0.0	0.0	0.0	0
altro	2.6	2.3	2.4	21
N**	192	699	891	891
<i>dati mancanti</i>	11	34	45	45

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

T26 Parenti/conoscenti: problema principale della persona sintomatica (2014)

Parenti o conoscenti		
	Totale	
	%	N
Problema principale della persona sintomatica*		
alcol	58.1	274
eroina	6.1	29
metadone	0.2	1
buprenorfina	0.0	0
fentanyl	0.0	0
altri oppioidi	0.2	1
cocaina	4.7	22
crack	0.0	0
altra forma di cocaina	0.0	0
anfetamine	1.3	6
metanfetamine	0.0	0
MDMA e affini (ecstasy)	0.2	1
catinoni sintetici	0.0	0
altri stimolanti	0.0	0
barbiturici	0.0	0
benzodiazepina	0.4	2
GHB/GBL	0.0	0
altri sonniferi e tranquillanti	0.0	0
LSD	0.0	0
ketamina	0.0	0
altri allucinogeni	0.0	0
sostanze volatili	0.2	1
canapa	21.0	99
tabacco	0.6	3
altra sostanza	0.4	2
gioco patologico	1.9	9
dipendenza al computer/Internet	4.0	19
disturbi alimentari	0.2	1
altro/i problema/i di dipendenza	0	2
N**	472	472
<i>dati mancanti</i>	464	464

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi)

T27 Sesso e età dei pazienti all'uscita (in rapporto al problema principale¹) e dei parenti o conoscenti (2014)

	Pazienti: problema principale ¹												Parenti o conoscenti			Tutte le uscite			
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Sesso*																			
maschile			70.6			74.7			82.6			83.2			20.9			64.3	3 904
femminile			29.4			25.3			17.4			16.8			79.1			35.7	2 164
sex non noto			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0	0
N**	2 160	900	3 060	233	79	312	176	37	213	775	156	931	200	759	959	3 904	2 164	6 068	6 068
Età (in anni)*																			
fino a 14 anni	0.0	0.3	0.1	0.0	1.3	0.3	0.0	0.0	0.0	3.1	3.2	3.1	1.0	0.5	0.6	1.0	0.8	0.9	57
15-19	1.4	1.7	1.5	1.3	1.3	1.3	4.0	8.1	4.7	58.3	54.5	57.7	5.1	2.9	3.4	14.7	7.8	12.3	742
20-24	3.1	2.1	2.8	8.2	10.3	8.7	9.7	18.9	11.3	13.8	12.2	13.6	4.6	2.9	3.3	6.8	4.7	6.0	366
25-29	6.8	6.4	6.6	11.6	10.3	11.3	17.6	24.3	18.8	8.4	9.0	8.5	5.1	4.7	4.7	8.2	6.8	7.7	465
30-34	9.5	7.2	8.9	18.0	16.7	17.7	31.8	2.7	26.8	7.4	8.3	7.5	5.1	9.4	8.5	10.9	8.4	10.0	604
35-39	10.2	9.5	10.0	17.6	14.1	16.7	11.9	21.6	13.6	3.2	2.6	3.1	4.6	9.4	8.4	9.1	9.3	9.2	555
40-44	12.4	10.6	11.8	21.0	21.8	21.2	11.4	8.1	10.8	2.7	5.1	3.1	9.1	12.1	11.5	10.4	11.0	10.6	643
45-49	15.2	18.4	16.1	12.4	15.4	13.2	8.5	10.8	8.9	1.8	2.6	1.9	13.2	18.5	17.4	11.1	15.8	12.8	774
50-54	13.6	14.8	14.0	6.9	5.1	6.4	2.8	2.7	2.8	0.8	1.9	1.0	14.7	15.3	15.2	9.6	13.0	10.8	654
55-59	12.3	11.9	12.2	2.1	3.8	2.6	1.7	0.0	1.4	0.4	0.0	0.3	12.7	10.2	10.7	8.0	9.3	8.4	511
60-64	7.0	9.3	7.7	0.4	0.0	0.3	0.0	2.7	0.5	0.0	0.0	0.0	8.6	5.2	5.9	4.6	6.2	5.2	312
65-69	4.6	4.7	4.6	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	5.2	5.4	3.0	4.1	3.4	205
70-74	2.5	2.1	2.4	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.5	0.0	0.6	0.1	5.6	2.3	3.0	1.7	1.7	1.7	103
75 e più	1.4	1.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	1.3	2.0	1.0	0.9	1.0	59
N**	2 158	897	3 055	233	78	311	176	37	213	773	156	929	197	752	949	3 897	2 153	6 050	6 050
<i>dati mancanti</i>	2	3	5	0	1	1	0	0	0	2	0	2	3	7	10	7	11	18	18
Età																			
media	46.8	47.7	47.1	38.1	37.6	38.0	34.5	33.6	34.3	22.2	23.6	22.4	49.1	46.4	47.0	39.6	43.7	41.1	
deviazione standard	13.1	12.7	13.0	9.2	10.0	9.4	9.1	10.4	9.3	8.2	10.4	8.6	16.3	13.2	14.0	15.7	14.7	15.5	
1° quartile	37.5	39.0	37.9	31.8	30.9	31.1	28.8	25.0	28.2	17.1	16.8	17.0	39.4	37.8	37.9	26.7	33.1	28.9	
mediana	47.4	48.4	47.7	38.4	37.8	38.3	33.4	29.6	33.4	18.4	18.5	18.4	50.5	47.4	48.0	39.7	45.4	42.1	
3° quartile	55.9	56.8	56.1	44.4	45.0	44.7	39.8	40.0	40.0	24.9	27.9	25.2	59.8	54.7	55.5	51.2	54.1	52.3	
N**	2 158	897	3 055	233	78	311	176	37	213	773	156	929	197	752	949	3 897	2 153	6 050	
<i>dati mancanti</i>	2	3	5	0	1	1	0	0	0	2	0	2	3	7	10	7	11	18	

¹ Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T28 Stato civile e grado di urbanizzazione del domicilio dei pazienti all'uscita (in rapporto al problema principale¹) e dei parenti o conoscenti (2014)

	Pazienti: problema principale ¹												Parenti o conoscenti			Tutte le uscite			N
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Stato civile*																			
celibe/nubile	37.4	34.5	36.6	67.8	61.1	66.2	61.7	75.0	64.0	94.6	89.6	93.8	24.7	23.9	24.0	54.7	40.5	50.1	1 905
sposato	35.7	30.3	34.2	14.8	19.4	15.9	21.3	10.0	19.3	3.1	0.9	2.7	53.8	52.6	52.8	26.4	32.4	28.4	1 080
separato-a (giuridicamente)	5.0	3.5	4.6	5.2	2.8	4.6	8.5	0.0	7.0	1.1	1.9	1.2	6.5	3.4	4.1	4.1	3.4	3.9	148
divorziato-a	20.1	27.7	22.3	11.3	13.9	11.9	8.5	15.0	9.6	1.3	6.6	2.1	14.0	17.2	16.6	13.6	20.5	15.9	604
vedovo-a	1.6	3.6	2.1	0.9	2.8	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.2	0.0	2.9	2.3	0.9	3.0	1.6	62
unione registrata	0.1	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.2	0.2	0.2	0.2	7
N**	1 474	577	2 051	115	36	151	94	20	114	556	106	662	93	348	441	2 558	1 248	3 806	3 806
<i>dati mancanti</i>	686	323	1 009	118	43	161	82	17	99	219	50	269	107	411	518	1 346	916	2 262	2 262
Grado di urbanizzazione*																			
grandi centri urbani	9.9	12.6	10.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.4	11.4	12.2	12.0	6.3	9.7	7.4	307
periferia dei grandi centri	10.5	9.5	10.2	0.8	0.0	0.6	4.2	4.8	4.3	3.2	4.5	3.4	0.0	2.3	1.8	7.5	6.0	7.0	290
città di media importanza	17.0	20.0	17.8	13.1	13.2	13.1	24.0	33.3	25.6	31.1	30.6	31.0	23.8	23.3	23.4	20.9	22.5	21.4	886
piccole città	33.9	32.6	33.6	52.5	57.9	53.8	49.0	38.1	47.0	33.2	28.8	32.5	30.5	33.7	33.0	35.7	34.8	35.4	1 465
campagna	28.7	25.3	27.8	33.6	28.9	32.5	22.9	23.8	23.1	32.5	33.3	32.6	34.3	28.5	29.7	29.6	27.0	28.7	1 189
N**	1 626	644	2 270	122	38	160	96	21	117	569	111	680	105	386	491	2 766	1 371	4 137	4 137
<i>dati mancanti</i>	534	256	790	111	41	152	80	16	96	206	45	251	95	373	468	1 138	793	1 931	1 931

¹ Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T29 Tipo di nucleo familiare, situazione di domicilio e tipo di relazione di coppia dei pazienti all'uscita (in rapporto al problema principale¹) e dei parenti o conoscenti (2014)

	Pazienti: problema principale ¹												Parenti o conoscenti			Tutte le uscite			
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Tipo di nucleo familiare*																			
da solo-a	39.6	33.3	37.8	39.7	29.4	37.0	29.4	43.5	32.0	12.7	13.3	12.8	21.3	16.8	17.7	30.8	27.2	29.7	1 223
con famiglia d'origine (genitori,ecc.)	5.8	4.9	5.6	14.2	5.9	12.0	17.6	13.0	16.8	67.1	52.2	64.8	10.1	5.8	6.7	23.0	11.4	19.2	793
con partner e/o figli	48.1	52.9	49.5	26.2	56.9	34.4	44.1	34.8	42.4	6.5	14.2	7.7	67.4	75.9	74.1	36.6	53.6	42.1	1 737
con amici o altre persone	2.4	2.9	2.5	5.7	0.0	4.2	2.9	0.0	2.4	1.6	4.4	2.0	0.0	1.2	1.0	2.4	2.5	2.5	102
in prigione	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	1.0	1.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	3
istituzione terapeutica/foyer	1.3	1.8	1.5	2.8	2.0	2.6	2.0	4.3	2.4	5.2	4.4	5.1	0.0	0.0	0.0	2.7	1.6	2.3	95
ospedale/clinica	0.5	0.8	0.6	0.0	2.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.4	0.4	15
altro	2.2	3.4	2.6	9.9	3.9	8.3	2.9	4.3	3.2	6.7	11.5	7.4	1.1	0.3	0.5	4.0	3.2	3.7	154
N**	1 573	649	2 222	141	51	192	102	23	125	629	113	742	89	328	417	2 786	1 336	4 122	4 122
<i>dati mancanti</i>	587	251	838	92	28	120	74	14	88	146	43	189	111	431	542	1 118	828	1 946	1 946
Situazione di domicilio*																			
situazione abitativa stabile	94.6	95.1	94.7	86.9	85.7	86.6	90.1	100.0	91.8	90.0	86.5	89.4	98.9	96.1	96.7	92.8	94.7	93.4	4 018
situazione abitativa instabile/senz	3.3	3.3	3.3	6.9	8.2	7.2	7.9	0.0	6.6	3.4	5.4	3.7	1.1	3.9	3.3	3.6	3.5	3.6	154
in prigione	0.4	0.0	0.3	2.1	0.0	1.5	1.0	0.0	0.8	0.5	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.3	14
istituzione/foyer/ospedale/altro	1.8	1.6	1.7	4.1	6.1	4.6	1.0	0.0	0.8	6.1	8.1	6.4	0.0	0.0	0.0	3.1	1.8	2.7	116
N**	1 690	689	2 379	145	49	194	101	21	122	618	111	729	93	359	452	2 898	1 404	4 302	4 302
<i>dati mancanti</i>	470	211	681	88	30	118	75	16	91	157	45	202	107	400	507	1 006	760	1 766	1 766
Tipo di relazione di coppia*																			
senza partner, sola-a	31.0	37.6	33.1	34.9	17.6	30.0	29.2	23.1	27.9	68.7	42.0	64.4	18.9	19.0	18.9	38.4	31.6	35.9	797
relazione-i saltuaria-e	4.0	4.9	4.3	9.3	5.9	8.3	8.3	23.1	11.5	5.7	16.0	7.3	3.8	3.3	3.4	4.5	5.8	5.0	110
relazione fissa, vivendo separat.	11.7	13.6	12.3	23.3	23.5	23.3	22.9	30.8	24.6	16.6	30.0	18.7	15.1	11.4	12.1	13.4	14.9	13.9	309
relazione fissa, vivendo insieme	53.3	43.9	50.4	32.6	52.9	38.3	39.6	23.1	36.1	9.1	12.0	9.5	62.3	66.4	65.5	43.7	47.8	45.2	1 001
N**	898	412	1 310	43	17	60	48	13	61	265	50	315	53	211	264	1 417	800	2 217	2 217
<i>dati mancanti</i>	1 262	488	1 750	190	62	252	128	24	152	510	106	616	147	548	695	2 487	1 364	3 851	3 851

¹ Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

**T30 Fonte di reddito principale e attività principale all'uscita, secondo il problema principale¹
e dei parenti o conoscenti (2014)**

	Pazienti: problema principale ¹												Parenti o conoscenti			Tutte le uscite			
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Fonte di reddito principale*																			
stipendio/salario	61.4	46.5	57.1	31.6	25.0	30.0	63.0	31.6	57.0	29.3	18.8	27.6	69.8	65.2	66.2	52.5	48.9	51.3	1 843
risparmi	1.3	0.7	1.1	0.0	0.0	0.0	1.2	5.3	2.0	0.4	0.0	0.3	2.1	0.3	0.7	1.0	0.6	0.9	32
rendita (AVS/AI o altre)	15.5	21.8	17.3	14.3	21.9	16.2	4.9	26.3	9.0	3.1	6.3	3.6	12.5	12.8	12.7	11.9	17.6	13.8	497
assistenza sociale	13.9	14.2	14.0	34.7	34.4	34.6	12.3	31.6	16.0	9.2	16.7	10.4	6.3	3.3	3.9	13.0	11.1	12.3	443
assicurazione disoccupazione	4.0	3.6	3.9	4.1	6.3	4.6	6.2	0.0	5.0	2.1	3.1	2.3	2.1	1.2	1.4	3.7	2.5	3.3	118
sostegno del/della partner	1.2	9.1	3.5	4.1	6.3	4.6	3.7	0.0	3.0	0.2	1.0	0.3	2.1	14.3	11.6	1.2	9.2	3.9	140
sostegno dei genitori/conoscenti	1.7	2.3	1.8	6.1	6.3	6.2	6.2	5.3	6.0	54.7	52.1	54.3	5.2	2.7	3.2	15.4	8.9	13.2	475
spacciando, trafficando	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.2	1.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.2	6
altre entrate illegali	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	1
prostituzione	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
assicurazione d'indennità giornaliera	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.3	10
altra	0.6	1.4	0.9	2.0	0.0	1.5	2.5	0.0	2.0	0.8	0.0	0.7	0.0	0.3	0.2	0.8	0.9	0.8	30
N**	1 387	563	1 950	98	32	130	81	19	100	519	96	615	96	336	432	2 392	1 203	3 595	3 595
<i>dati mancanti</i>	773	337	1 110	135	47	182	95	18	113	256	60	316	104	423	527	1 512	961	2 473	2 473
Attività principale*																			
att. a tempo pieno (70% o più)	56.5	33.5	50.1	30.9	23.1	29.0	64.6	26.3	57.1	17.9	15.9	17.6	65.2	49.0	52.7	46.1	36.4	42.9	1 358
attività a tempo parziale	4.2	20.4	8.7	2.5	19.2	6.5	1.3	5.3	2.0	1.4	0.0	1.2	3.4	27.5	22.0	3.2	20.0	8.7	274
lavori occasionali	1.5	1.3	1.5	4.9	0.0	3.7	1.3	0.0	1.0	1.0	0.0	0.8	2.2	1.7	1.8	1.5	1.4	1.5	46.0
in formazione	1.9	2.6	2.1	3.7	7.7	4.7	3.8	5.3	4.1	62.4	59.1	61.9	3.4	4.3	4.1	18.4	10.6	15.8	501
disoccup., ricerc. di un lavoro	7.2	6.8	7.1	12.3	7.7	11.2	13.9	15.8	14.3	4.4	9.1	5.1	2.2	1.0	1.3	6.7	5.1	6.2	196
disoccup., senza ricerc. di un lavoro	4.3	5.7	4.7	13.6	3.8	11.2	3.8	5.3	4.1	2.4	6.8	3.0	2.2	1.0	1.3	4.3	3.8	4.1	131
rendita	10.4	14.9	11.7	0.0	7.7	1.9	1.3	5.3	2.0	0.2	2.3	0.5	13.5	9.9	10.7	6.7	11.1	8.1	257
incapacità di lavoro	5.1	5.0	5.0	14.8	15.4	15.0	2.5	5.3	3.1	2.2	1.1	2.0	0.0	1.7	1.3	4.3	4.0	4.2	133
casalinga/casalingo	0.2	2.4	0.8	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	1.8	0.2	1.8	0.7	22.0
altra	8.8	7.4	8.4	17.3	15.4	16.8	5.1	31.6	10.2	8.2	5.7	7.8	7.9	1.7	3.1	8.6	5.9	7.7	245
N**	1 188	457	1 645	81	26	107	79	19	98	503	88	591	89	302	391	2 135	1 028	3 163	3 163
<i>dati mancanti</i>	972	443	1 415	152	53	205	97	18	115	272	68	340	111	457	568	1 769	1 136	2 905	2 905

¹ Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T31 Statuto professionale dei pazienti all'uscita (in rapporto al problema principale¹) e dei parenti o conoscenti (2014)

	Pazienti: problema principale ¹												Parenti o conoscenti			Tutte le uscite			N
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Statuto professionale*																			
senza attività professionale	26.4	43.7	31.3	51.1	43.8	49.2	22.0	71.4	29.2	13.5	32.3	16.5	50.0	24.1	28.6	25.3	38.2	28.8	358
apprendista, praticante	1.8	0.9	1.5	2.2	0.0	1.6	7.3	0.0	6.3	47.2	25.8	43.8	0.0	0.0	0.0	11.4	5.5	9.8	121
manovale, operaio-a ausiliar.	3.3	2.7	3.2	6.7	12.5	8.2	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	3.1	2.9	3.1	38
operaio-a con formaz. pratica	5.3	5.4	5.3	2.2	6.3	3.3	12.2	0.0	10.4	1.8	3.2	2.1	0.0	3.4	2.9	4.8	4.7	4.8	59
oper. con form. certif. (AFC)	11.0	4.5	9.2	11.1	18.8	13.1	19.5	14.3	18.8	10.4	3.2	9.3	16.7	6.9	8.6	11.0	5.0	9.3	116
caposquadra	1.9	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	1.0	13
impiegato-a non qualificato-a	19.8	24.3	21.1	11.1	18.8	13.1	12.2	0.0	10.4	1.2	6.5	2.1	16.7	48.3	42.9	14.7	23.3	17.1	212
impieg. qualif., quadro medio	14.2	10.8	13.2	8.9	0.0	6.6	9.8	14.3	10.4	1.8	3.2	2.1	16.7	6.9	8.6	10.7	8.2	10.0	124
imp. funz. dirett., quadr. sup.	4.9	1.8	4.0	2.2	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	2.9	3.6	1.5	3.0	37
indipendente	9.1	4.1	7.7	2.2	0.0	1.6	14.6	0.0	12.5	0.6	0.0	0.5	0.0	6.9	5.7	6.8	4.1	6.0	75
scolaro-a, studente	0.9	0.5	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.9	25.8	21.6	0.0	0.0	0.0	5.7	5.2	5.6	69
altro statuto	1.4	1.4	1.4	2.2	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	1.6	1.5	1.5	19
N**	571	222	793	45	16	61	41	7	48	163	31	194	6	29	35	898	343	1 241	1 241
<i>dati mancanti</i>	<i>1 589</i>	<i>678</i>	<i>2 267</i>	<i>188</i>	<i>63</i>	<i>251</i>	<i>135</i>	<i>30</i>	<i>165</i>	<i>612</i>	<i>125</i>	<i>737</i>	<i>194</i>	<i>730</i>	<i>924</i>	<i>3 006</i>	<i>1 821</i>	<i>4 827</i>	<i>4 827</i>

¹ Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T32a Ragione principale della fine del trattamento/accompagnamento dei pazienti (in rapporto al problema principale¹) e dei parenti o conoscenti (2014)

Ragione principale*	Pazienti: problema principale ¹												Parenti o conoscenti			Tutte le uscite			N
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
condus. pianific. senza passag.	52.4	47.4	50.9	32.2	39.2	34.0	46.0	29.7	43.2	66.9	60.9	65.9	74.4	66.0	67.7	55.0	55.8	55.3	3 330
conclus. pianific. con passag.	5.1	6.9	5.6	15.7	10.1	14.2	7.4	10.8	8.0	4.1	5.1	4.3	1.5	2.1	2.0	5.5	5.3	5.4	328
cambio di domicilio	1.6	2.0	1.8	3.5	6.3	4.2	5.1	2.7	4.7	1.3	3.8	1.7	0.5	0.7	0.6	1.8	1.7	1.7	105
ospedalizzazione	0.7	1.6	0.9	0.4	1.3	0.6	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.4	0.0	0.4	0.3	0.5	0.8	0.6	39
incarcerazione	0.1	0.0	0.1	2.2	0.0	1.6	0.6	0.0	0.5	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	11
perdita di contatto	25.3	28.3	26.2	26.1	29.1	26.9	29.5	40.5	31.5	16.0	17.9	16.3	17.1	21.4	20.5	23.3	24.4	23.7	1 426
conclusione esplicita	11.2	9.8	10.8	14.8	10.1	13.6	9.1	10.8	9.4	8.1	9.0	8.3	3.5	6.5	5.9	10.2	8.3	9.5	573
decesso	1.9	2.0	2.0	3.0	2.5	2.9	0.0	2.7	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.1	0.2	1.4	1.0	1.2	75
altre cause	1.5	2.0	1.7	2.2	1.3	1.9	2.3	2.7	2.3	2.7	3.2	2.8	2.5	2.8	2.7	2.0	2.6	2.2	134
N**	2 136	889	3 025	230	79	309	176	37	213	774	156	930	199	756	955	3 872	2 149	6 021	6 021
dati mancanti	24	11	35	3	0	3	0	0	0	1	0	1	1	3	4	32	15	47	47

T32b Destinazione dei trasferimenti dei pazienti (in rapporto al problema principale¹) e dei parenti o conoscenti (2014)

Destinazione dei trasferimenti***	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Parenti o conoscenti			Tutte le uscite			N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	
terapia residenziale	28.6	31.3	29.4	16.7	33.3	20.0	12.5	0.0	10.0	19.0	25.0	20.0	0.0	12.5	12.5	22.0	27.9	23.8	46
struttura di giorno/clinica di giorno	1.4	6.3	2.9	4.2	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	3.3	2.6	5
consulenza ambulatoriale	42.9	37.5	41.2	62.5	50.0	60.0	75.0	0.0	60.0	38.1	75.0	44.0	0.0	50.0	50.0	49.2	44.3	47.7	92
appartamento protetto	2.9	9.4	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	10.0	9.5	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	3.0	6.6	4.1	8
altra istituzione specializzata	24.3	15.6	21.6	16.7	16.7	16.7	12.5	50.0	20.0	33.3	0.0	28.0	0.0	37.5	37.5	23.5	18.0	21.8	42
N**	70	32	102	24	6	30	8	2	10	21	4	25	0	8	8	132	61	193	193
dati mancanti	39	29	68	12	2	14	5	2	7	11	4	15	3	8	11	82	53	135	135

T32c Causa di decesso dei pazienti (in rapporto al problema principale¹) e dei parenti o conoscenti (2014)

Cause di decesso****	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Parenti o conoscenti			Tutte le uscite			N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	
suicidio	10.7	0.0	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.4	0.0	8.2	4
infortunio	7.1	16.7	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	14.3	8.2	4
malattia	78.6	83.3	80.0	50.0	0.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	74.3	78.6	75.5	37
overdose o intossicazione acuta	0.0	0.0	0.0	50.0	100.0	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	7.1	6.1	3
altre cause di decesso	3.6	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	2.0	1.0
N**	28	12	40	4	1	5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	35	14	49	49
dati mancanti	13	6	19	3	1	4	0	1	1	0	0	0	1	0	1	18	8	26	26

¹ Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

*** I risultati si basano solamente sui clienti trasferiti. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

**** I risultati si basano solamente sui clienti deceduti durante l'intervento. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

T33 Durata dell'intervento sui pazienti (in rapporto al problema principale¹) e sui parenti o conoscenti (2014)

	Pazienti: problema principale ¹												Parenti o conoscenti			Tutte le uscite			
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale							
Durata della presa in carico* (%)																			
1 settimana o meno	4.2	5.2	4.5	2.1	3.8	2.6	2.3	0.0	1.9	3.4	3.8	3.4	15.5	10.5	11.6	4.4	6.7	5.2	316
> 1 settimana a 1 mese	3.4	2.9	3.3	1.3	1.3	1.3	2.3	0.0	1.9	11.4	7.7	10.7	4.5	4.9	4.8	4.9	3.9	4.5	275
> 1 a 2 mesi	3.6	3.0	3.4	2.6	5.1	3.2	5.7	5.4	5.6	8.9	5.8	8.4	3.5	5.0	4.7	4.8	4.5	4.7	286
> 2 a 3 mesi	3.5	4.4	3.8	1.3	0.0	1.0	2.8	2.7	2.8	8.1	6.4	7.8	7.0	5.1	5.5	4.7	4.4	4.6	279
> 3 a 6 mesi	11.0	12.0	11.3	8.6	7.6	8.3	10.8	13.5	11.3	17.8	13.5	17.1	15.0	14.6	14.7	12.6	13.3	12.9	779
> 6 mesi a 1 anno	25.3	28.1	26.2	29.6	27.8	29.2	27.8	35.1	29.1	32.9	44.2	34.8	33.0	30.2	30.8	28.8	30.7	29.4	1 784
> 1 a 2 anni	21.6	23.3	22.1	18.5	19.0	18.6	29.5	27.0	29.1	12.5	12.8	12.6	12.0	20.9	19.1	19.5	21.5	20.2	1 226
> 2 a 3 anni	9.0	9.1	9.1	6.0	6.3	6.1	9.1	5.4	8.5	3.4	3.8	3.4	4.0	4.2	4.2	7.0	6.6	6.8	415
> 3 a 5 anni	7.4	6.8	7.2	12.4	17.7	13.8	5.7	2.7	5.2	1.3	0.6	1.2	3.5	3.3	3.3	5.7	5.1	5.5	334
> 5 a 10 anni	10.2	4.9	8.6	15.9	10.1	14.4	2.8	8.1	3.8	0.4	1.3	0.5	2.0	0.9	1.1	7.1	3.0	5.6	341
più di 10 anni	0.6	0.2	0.5	1.7	1.3	1.6	1.1	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.5	0.3	0.4	27
N**	2 155	900	3 055	233	79	312	176	37	213	775	156	931	200	759	959	3 899	2 163	6 062	6 062
<i>dati mancanti</i>	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	6	6
Durata (in settimane)																			
media	96.0	74.8	89.8	127.0	115.8	124.2	72.8	76.9	73.5	33.3	39.5	34.4	43.4	46.4	45.8	77.4	61.6	71.8	
deviazione standard	119.1	89.9	111.7	140.4	134.3	138.7	86.1	96.7	87.8	38.6	53.0	41.4	59.9	61.7	61.3	105.1	80.5	97.3	
1° quartile	23.4	22.4	23.0	32.0	33.1	32.1	24.5	26.1	25.6	9.0	13.0	9.1	9.8	12.0	11.1	18.0	16.6	17.3	
mediana	50.3	44.1	48.1	58.1	55.9	57.0	45.9	50.0	45.9	24.1	28.8	25.4	26.0	29.7	29.3	39.0	36.9	38.1	
3° quartile	112.0	89.7	106.3	182.6	177.1	182.1	84.7	77.0	82.0	41.9	45.5	42.3	49.5	58.4	56.4	84.0	73.6	79.9	
N**	2 155	900	3 055	233	79	312	176	37	213	775	156	931	200	759	959	3 899	2 163	6 062	
<i>dati mancanti</i>	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	6	

¹ Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T34 Trattamento sostitutivo durante e immediatamente dopo l'intervento, in rapporto al problema principale¹ (solamente pazienti) (2014)

	Pazienti: problema principale ¹												Tutti i pazienti			
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Sostituzione nel corso dell'intervento*																
no	98.7	97.6	98.4	56.4	61.8	57.8	95.2	85.0	93.3	99.8	100.0	99.8	96.7	96.5	96.6	2 928
sì	1.3	2.4	1.6	43.6	38.2	42.2	4.8	15.0	6.7	0.2	0.0	0.2	3.3	3.5	3.4	102
N**	1 286	548	1 834	101	34	135	84	20	104	513	93	606	2 196	834	3 030	3 030
<i>dati mancanti</i>	874	352	1 226	132	45	177	92	17	109	262	63	325	1 508	572	2 080	2 080
Tipo di sostituzione***																
eroina	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	1.0	1
metadone	86.7	83.3	85.2	88.4	84.6	87.5	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	100.0	87.0	85.7	86.6	84
altri oppiacei	6.7	8.3	7.4	4.7	15.4	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	10.7	6.2	6
altre sostanze	6.7	8.3	7.4	4.7	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.2	3.6	6.2	6
N**	15	12	27	43	13	56	3	3	6	1	0	1	69	28	97	97
<i>dati mancanti</i>	2	1	3	1	0	1	1	0	1	0	0	0	4	1	5	5
Sostituzione dopo l'intervento*																
no	98.8	98.9	98.8	71.8	72.4	71.9	96.1	73.3	92.4	99.6	98.8	99.5	97.7	97.6	97.7	2 845
sì	1.2	1.1	1.2	28.2	27.6	28.1	3.9	26.7	7.6	0.4	1.2	0.5	2.3	2.4	2.3	68
N**	1 275	536	1 811	85	29	114	77	15	92	473	81	554	2 120	793	2 913	2 913
<i>dati mancanti</i>	885	364	1 249	148	50	198	99	22	121	302	75	377	1 584	613	2 197	2 197
Tipo di sostituzione***																
prescrizione di eroina	0.0	16.7	4.8	8.3	0.0	6.3	33.3	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0	8.2	5.3	7.4	5
trattamento sostitutivo	100.0	83.3	95.2	91.7	100.0	93.8	66.7	100.0	85.7	100.0	100.0	100.0	91.8	94.7	92.6	63
N**	15	6	21	24	8	32	3	4	7	2	1	3	49	19	68	68
<i>dati mancanti</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹ Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

*** I risultati si basano solamente sui clienti ai quali è stata prescritta una sostituzione durante l'intervento. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

T35 Postassistenza prevista e preparata, in rapporto al problema principale¹ (solamente pazienti) (2014)

	Pazienti: problema principale ¹												Tutti i pazienti			
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Postassistenza prevista e preparata*																
no	90.9	84.8	89.3	88.6	69.6	83.9	92.0	62.5	87.9	97.3	87.5	95.9	92.3	83.8	90.3	1 326
sì	9.1	15.2	10.7	11.4	30.4	16.1	8.0	37.5	12.1	2.7	12.5	4.1	7.7	16.2	9.7	142
N**	726	256	982	70	23	93	50	8	58	188	32	220	1 122	346	1 468	1 468
<i>dati mancanti</i>	1 434	644	2 078	163	56	219	126	29	155	587	124	711	2 582	1 060	3 642	3 642
Tipo di postassistenza prevista***																
appartamento protetto dell'istituzione	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	12.5	1.2	0.0	0.8	1
servizio di postassistenza dell'istituzione	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
appartamento protetto esterno	7.9	2.9	6.1	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0	7.3	2.0	5.3	7
servizio di postassistenza esterno	12.7	20.0	15.3	14.3	14.3	14.3	50.0	0.0	28.6	20.0	0.0	12.5	14.6	15.7	15.0	20
centro di consulenza per problemi inerenti all'alcol	27.0	22.9	25.5	42.9	0.0	21.4	0.0	33.3	14.3	20.0	0.0	12.5	25.6	19.6	23.3	31
centro di consulenza per problemi inerenti alle droghe	1.6	5.7	3.1	28.6	0.0	14.3	25.0	0.0	14.3	0.0	33.3	12.5	4.9	7.8	6.0	8
altri centri di consulenza	12.7	8.6	11.2	0.0	14.3	7.1	0.0	33.3	14.3	40.0	33.3	37.5	13.4	13.7	13.5	18
gruppo di aiuto reciproco e di autosostegno	9.5	8.6	9.2	0.0	14.3	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	7.8	7.5	10
gruppo di precedenti utenti del centro/ dell'istituzione	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
altro-i	33.3	37.1	34.7	14.3	57.1	35.7	50.0	33.3	42.9	20.0	66.7	37.5	32.9	39.2	35.3	47
N**	63	35	98	7	7	14	4	3	7	5	3	8	82	51	133	133
<i>dati mancanti</i>	3	4	7	1	0	1	0	0	0	0	1	1	4	5	9	9

¹ Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

*** I risultati si basano solamente sui clienti per i quali una postassistenza è prevista. Le categorie non sono esclusive (molte risposte possibili)

T36 Problemi di dipendenza all'uscita, in rapporto al problema principale¹ (solamente pazienti) (2014)

Problemi di dipendenza all'uscita*	Pazienti: problema principale ¹												Tutti i pazienti			
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
alcol	70.3	73.3	71.2	21.4	6.1	17.5	23.5	22.7	23.4	11.4	13.9	11.8	46.4	50.8	47.6	1 740
eroina	1.2	0.6	1.0	64.1	53.1	61.3	4.3	27.3	8.0	0.3	1.7	0.5	4.8	3.7	4.5	164
metadone	0.3	0.5	0.4	10.3	10.2	10.3	0.0	9.1	1.5	0.0	0.0	0.0	0.8	1.0	0.8	31
buprenorfina	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	1
fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
altri oppioidi	0.0	0.2	0.0	2.1	6.1	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	0.3	10
cocaina	2.1	1.2	1.9	13.8	8.2	12.4	58.3	31.8	54.0	1.3	1.7	1.4	5.1	2.1	4.3	157
crack	0.1	0.2	0.1	0.0	2.0	0.5	3.5	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	7
altra forma di cocaina	0.1	0.0	0.0	1.4	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	5
anfetamine	0.6	0.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.9	4.5	1.5	0.5	0.9	0.5	1.1	0.7	1.0	35
metanfetamine	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	7
MDMA e affini (ecstasy)	0.3	0.2	0.2	0.7	0.0	0.5	1.7	0.0	1.5	1.3	1.7	1.4	0.9	0.6	0.8	30
catinoni sintetici	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
altri stimolanti	0.1	0.0	0.1	0.0	2.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	4
barbiturici	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
benzodiazepina	1.2	2.6	1.6	6.9	8.2	7.2	0.0	9.1	1.5	0.0	0.0	0.0	1.4	3.2	1.9	70
GHB/GBL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
altri sonniferi e tranquillanti	0.1	0.5	0.2	0.0	2.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	0.4	14
LSD	0.1	0.0	0.1	0.0	2.0	0.5	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.8	0.4	0.1	0.3	11
ketamina	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
altri allucinogeni	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	1
sostanze volatili	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.1	0.0	0.1	3
canapa	4.1	2.3	3.6	15.2	6.1	12.9	12.2	13.6	12.4	63.7	73.9	65.3	20.0	11.1	17.5	640
tabacco	13.5	11.6	12.9	14.5	10.2	13.4	13.0	22.7	14.6	15.9	13.9	15.6	15.0	13.8	14.7	536
altra sostanza	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.7	0.2	0.0	0.1	0.2	0.2	0.2	8
gioco patologico	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.1	1.4	50
dipendenza al computer/Internet	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.8	1.8	0.5	1.4	52
disturbi alimentari	0.0	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.1	0.2	6.4	1.9	71
altro/i problema/i di dipendenza	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.5	0.7	26
nessuno	26.2	23.0	25.2	13.1	20.4	14.9	27.0	40.9	29.2	28.6	22.6	27.7	25.6	22.2	24.7	901
N**	1 496	656	2 152	145	49	194	115	22	137	615	115	730	2 624	1 030	3 654	3 654
<i>dati mancanti</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

¹ Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

* Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

T37 Frequenza delle ricadute e sostanza o comportamento implicato nel corso dell'intervento, in rapporto al problema principale¹ (solamente pazienti) (2014)

	Pazienti: problema principale ¹												Tutti i pazienti			
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Frequenza delle ricadute*																
nessuna	56.1	47.0	54.0	37.8	52.9	42.6	52.9	42.9	51.2	66.9	65.2	66.7	56.8	51.1	55.5	563
1 volta	6.8	6.0	6.6	0.0	5.9	1.9	20.6	14.3	19.5	6.0	13.0	7.1	7.4	6.6	7.2	73
2 volte	8.3	10.8	8.9	8.1	0.0	5.6	5.9	0.0	4.9	9.8	0.0	8.3	8.1	8.4	8.2	83
3 o 4 volte	11.5	15.7	12.5	8.1	11.8	9.3	8.8	14.3	9.8	4.5	8.7	5.1	9.8	14.1	10.7	109
5 volte o più	17.2	20.5	18.0	45.9	29.4	40.7	11.8	28.6	14.6	12.8	13.0	12.8	17.9	19.8	18.3	186
N**	529	166	695	37	17	54	34	7	41	133	23	156	787	227	1 014	1 014
<i>dati mancanti</i>	1 631	734	2 365	196	62	258	142	30	172	642	133	775	2 917	1 179	4 096	4 096
Sostanza/comportamento comparabile a una dipendenza al momento delle ricadute***																
alcol	98.2	97.6	98.0	27.3	14.3	24.1	40.0	75.0	47.4	26.3	0.0	21.7	77.4	83.8	79.0	331
oppioidi	1.4	4.8	2.3	77.3	85.7	79.3	13.3	25.0	15.8	2.6	0.0	2.2	7.6	10.5	8.4	35
cocaina e derivati	3.7	6.0	4.3	40.9	14.3	34.5	86.7	75.0	84.2	10.5	0.0	8.7	12.1	8.6	11.2	47
altri stimolanti	1.4	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	4.3	2.2	0.0	1.7	7
ipnotici/sedativi	0.0	9.5	2.6	4.5	0.0	3.4	0.0	25.0	5.3	0.0	0.0	0.0	1.3	9.5	3.3	14
allucinogeni	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	3.4	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	2.2	0.3	1.0	0.5	2
sostanze volatili	0.5	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	1
canapa	5.9	3.6	5.3	27.3	14.3	24.1	20.0	0.0	15.8	86.8	100.0	89.1	20.1	12.4	18.1	76
tabacco	3.2	6.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	12.5	8.7	3.8	6.7	4.5	19
altra/e sostanza/e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
gioco patologico	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.5	2
dipendenza al computer/Internet	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.5	2
disturbi alimentari	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
altri problemi assimilabili a una dipendenza	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
N**	219	84	303	22	7	29	15	4	19	38	8	46	314	105	419	419
<i>dati mancanti</i>	13	4	17	1	1	2	1	0	1	6	0	6	26	6	32	32

¹ Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

*** I risultati si basano solamente sui clienti che hanno indicato una o più ricadute. Le categorie non sono esclusive (più risposte possibili); percentuali per colonna

T38 Frequenza del consumo di tabacco e numero di sigarette al giorno nel corso dei 30 giorni precedenti l'uscita, in rapporto al problema principale (solamente pazienti) (2014)

	Pazienti: problema principale ¹												Tutti i pazienti			
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Frequenza del consumo di tabacco*																
mai	41.3	44.7	42.2	11.6	14.3	12.3	20.0	0.0	17.6	13.3	27.8	15.1	33.3	40.2	34.9	332
1 giorno alla settimana o meno	1.3	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	2.1	1.4	0.4	1.2	11
2 a 3 giorni alla settimana	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	0.0	4.8	1.1	0.0	0.8	8
4 a 6 giorni alla settimana	0.6	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	5.6	2.1	0.7	0.4	0.6	6
una volta al giorno	2.8	5.6	3.5	11.6	14.3	12.3	3.3	25.0	5.9	6.3	0.0	5.5	3.7	5.7	4.2	40
più volte al giorno	53.8	49.7	52.7	76.7	71.4	75.4	76.7	75.0	76.5	71.1	66.7	70.5	59.8	53.3	58.2	553
N**	470	179	649	43	14	57	30	4	34	128	18	146	721	229	950	950
<i>dati mancanti</i>	1 690	721	2 411	190	65	255	146	33	179	647	138	785	2 983	1 177	4 160	4 160
Numero di sigarette al giorno***																
0 a 10 sigarette al giorno	18.9	25.8	20.8	13.3	20.0	15.0	30.0	33.3	30.4	40.2	55.6	41.5	24.1	28.6	25.1	134
11 a 20 sigarette al giorno	41.2	56.2	45.3	60.0	70.0	62.5	55.0	66.7	56.5	42.3	44.4	42.5	42.7	56.3	45.7	244
21 a 30 sigarette al giorno	28.2	16.9	25.1	26.7	10.0	22.5	5.0	0.0	4.3	15.5	0.0	14.2	25.1	14.3	22.7	121
31 sigarette al giorno o più	11.8	1.1	8.9	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	8.7	2.1	0.0	1.9	8.2	0.8	6.6	35
N**	238	89	327	30	10	40	20	3	23	97	9	106	415	119	534	534
<i>dati mancanti</i>	38	10	48	8	2	10	4	1	5	14	4	18	66	18	84	84

¹ Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

*** I risultati si basano solamente sui clienti che hanno indicato un consumo di tabacco. Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

T39 Obiettivo di consumo all'uscita e pronostico, in rapporto alla principale sostanza problematica¹ (solamente pazienti) (2014)

	Pazienti: sostanza problematica ¹												Tutti i pazienti			
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Obiettivo di consumo*																
astinenza definitiva	36.2	37.5	36.6	81.6	93.3	84.9	82.9	71.4	81.0	45.8	52.4	46.6	42.1	45.3	42.9	468
astinenza limitata nel tempo	12.5	8.5	11.5	2.6	6.7	3.8	5.7	14.3	7.1	8.5	0.0	7.4	10.7	7.8	10.0	109
consumo controllato	36.9	36.5	36.8	7.9	0.0	5.7	5.7	0.0	4.8	29.6	19.0	28.2	32.8	30.2	32.2	351
nessuna limitazione nel consumo prevista	3.5	4.0	3.7	2.6	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	6.3	19.0	8.0	4.0	5.0	4.2	46
nessuna decisione per il momento	9.7	12.5	10.4	5.3	0.0	3.8	5.7	14.3	7.1	9.2	9.5	9.2	9.4	10.9	9.7	106
altro	1.1	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.6	1.1	0.8	1.0	11
N**	566	200	766	38	15	53	35	7	42	142	21	163	833	258	1 091	1 091
<i>dati mancanti</i>	<i>1 594</i>	<i>700</i>	<i>2 294</i>	<i>195</i>	<i>64</i>	<i>259</i>	<i>141</i>	<i>30</i>	<i>171</i>	<i>633</i>	<i>135</i>	<i>768</i>	<i>2 871</i>	<i>1 148</i>	<i>4 019</i>	<i>4 019</i>
Pronostico*																
pronostico molto positivo	19.2	9.4	16.6	15.6	5.3	12.5	19.5	0.0	16.7	20.6	21.7	20.8	18.8	10.4	16.8	186
pronostico positivo	44.6	43.6	44.3	31.1	68.4	42.2	46.3	28.6	43.8	50.0	43.5	49.1	45.4	47.0	45.8	507
pronostico piuttosto sfavorevole	26.8	33.2	28.5	40.0	26.3	35.9	24.4	71.4	31.3	26.5	30.4	27.0	27.3	31.7	28.3	314
pronostico negativo	9.4	13.9	10.6	13.3	0.0	9.4	9.8	0.0	8.3	2.9	4.3	3.1	8.6	10.8	9.1	101
N**	556	202	758	45	19	64	41	7	48	136	23	159	840	268	1 108	1 108
<i>dati mancanti</i>	<i>1 604</i>	<i>698</i>	<i>2 302</i>	<i>188</i>	<i>60</i>	<i>248</i>	<i>135</i>	<i>30</i>	<i>165</i>	<i>639</i>	<i>133</i>	<i>772</i>	<i>2 864</i>	<i>1 138</i>	<i>4 002</i>	<i>4 002</i>

¹ Il problema principale è stabilito all'entrata. Questa informazione non è disponibile per i clienti entrati prima dell'inizio del monitoraggio

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

A1 Dati di base delle istituzioni non partecipanti: sesso e età all'entrata, in funzione del problema principale (2014)

	Pazienti: problema principale												Tutti gli interventi***			
	Alcol			Oppioidi			Cocaina e derivati			Canapa			Uomini	Donne	Totale	N
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale				
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Sesso*																
uomini			65.6			69.1			78.9			79.6			68.2	1034
donne			34.4			30.9			21.1			20.4			31.8	483
sex non noto			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0	0
N**	578	303	881	85	38	123	60	16	76	172	44	216	1 034	483	1 517	1 517
Età (in anni)*																
fino a 14	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	1.4	0.2	1.1	0.5	7
15-19	1.6	1.3	1.5	1.2	2.6	1.6	1.7	12.5	3.9	25.3	21.4	24.5	6.3	4.5	5.8	86
20-24	3.1	4.7	3.7	7.1	10.5	8.1	15.0	0.0	11.8	22.4	4.8	18.9	9.1	5.7	8.0	120
25-29	8.0	6.7	7.6	10.6	15.8	12.2	16.7	31.3	19.7	21.8	11.9	19.8	12.3	8.9	11.2	168
30-34	9.4	11.8	10.2	18.8	18.4	18.7	31.7	18.8	28.9	10.6	9.5	10.4	13.0	12.1	12.7	190
35-39	12.1	10.8	11.6	17.6	13.2	16.3	21.7	6.3	18.4	11.8	4.8	10.4	13.0	10.0	12.0	180
40-44	12.4	9.1	11.3	21.2	21.1	21.1	8.3	12.5	9.2	3.5	7.1	4.2	10.9	11.0	11.0	164
45-49	16.3	13.1	15.2	16.5	13.2	15.4	5.0	6.3	5.3	2.9	14.3	5.2	11.6	12.3	11.8	177
50-54	14.3	20.5	16.5	2.4	2.6	2.4	0.0	0.0	0.0	0.6	16.7	3.8	9.5	16.8	11.8	176
55-59	10.7	10.8	10.7	3.5	2.6	3.3	0.0	6.3	1.3	1.2	2.4	1.4	6.8	8.7	7.4	111
60-64	5.6	4.0	5.1	1.2	0.0	0.8	0.0	6.3	1.3	0.0	0.0	0.0	3.3	3.4	3.3	50
65-69	4.4	2.7	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	1.9	2.4	36
70-74	1.4	2.7	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.9	1.1	17
75 e più	0.5	1.7	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.7	0.9	13
N**	572	297	869	85	38	123	60	16	76	170	42	212	1 024	471	1 495	1 495
<i>dati mancanti</i>	6	6	12	0	0	0	0	0	0	2	2	4	10	12	22	22
Età																
media	45.3	45.8	45.4	38.1	35.9	37.4	32.6	34.8	33.1	26.9	33.8	28.3	39.5	42.8	40.5	
deviazione standard	12.4	13.3	12.7	9.2	9.4	9.3	7.2	12.5	8.5	8.9	14.5	10.6	13.5	14.2	13.8	
1° quartile	35.6	35.3	35.5	31.5	28.4	30.3	26.4	26.4	26.4	19.9	17.9	19.6	28.9	32.1	29.7	
mediana	45.9	47.0	46.1	38.3	36.6	37.8	33.3	30.9	32.7	25.3	34.4	25.7	38.3	43.0	39.9	
3° quartile	54.1	54.8	54.3	44.2	41.4	43.7	37.39	43.0	37.7	31.4	48.0	35.3	49.2	53.2	51.0	
N**	572	297	869	85	38	123	60	16	76	170	42	212	1 024	471	1 495	
<i>dati mancanti</i>	6	6	12	0	0	0	0	0	0	2	2	4	10	12	22	

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto

A2 Dati di base delle istituzioni non partecipanti: problema principale all'entrata (2014)

Tutti i pazienti				
	Uomini	Donne	Totale	
	%	%	%	N
Problema principale*				
alcol	55.9	62.7	58.1	881
oppioidi	8.2	7.9	8.1	123
cocaina	5.8	3.3	5.0	76
altri stimolanti	1.6	2.5	1.9	29
ipnotici/sedativi	1.1	3.1	1.7	26
allucinogeni	0.1	0.0	0.1	1
sostanze volatili	0.0	0.0	0.0	0
canapa	16.6	9.1	14.2	216
tabacco	0.4	1.0	0.6	9
altra/e sostanza/e	0.3	2.7	1.1	16
uso multiplo**	4.4	1.4	3.4	52
altri problemi assimilabili a una dipendenza	5.6	6.2	5.8	88
N***	1 034	483	1 517	1 517
<i>dati mancanti</i>	0	0	0	0

* Percentuali per colonna; una sola categoria possibile

** Diverse istituzioni non definiscono il problema principale per act-info seguendo le direttive e indicano ad esempio "uso multiplo". Pertanto, la distribuzione risultante non è direttamente comparabile con quella delle istituzioni partecipanti

*** Numero esatto di casi sui quali sono calcolati i valori della colonna corrispondente (dati mancanti esclusi). I totali comprendono ugualmente le persone il cui sesso non è noto